PERÚ Ministerio del Ambiente
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI
Subdirección de Predicción Agrometeorológica

TENDENCIA AGROMETEOROLOGICA

NOVIEMBRE – DICIEMBRE - ENERO 2016 - 2017

Próxima actualización: DICIEMBRE 2016

Suscribirse aquí

dga@senamhi.gob.pe

TENDENCIA AGROMETEOROLÓGICA

Noviembre – Enero 2016-17

En base a la previsión estacional correspondiente al período Noviembre 2016 – Enero 2017 se esperarían los siguientes efectos en los cultivos más representativos:

De acuerdo a las predicciones globales de la Temperatura Superficial del Mar para los períodos NDE y DEF 2016-17, se prevé que el Pacífico Ecuatorial centro-oriental mantenga anomalías frías, mientras que el Pacífico Suroriental, junto a la costa de Sudamérica, permanezca anomalías ligeramente cálidas.

Fuente: cpc.ncep.noaa.gov/products/ CFSv2 forecast seasonal SST anomalies.

MANGO

Para el departamento de Piura, se prevé condiciones térmicas diurnas y nocturnas ligeramente cálidas; mientras que para Lambayeque se esperan temperaturas máximas por encima de su normal las cuales promoverán la fructificación en algunas variedades de mango; y los descensos marcados de las temperaturas mínimas propiciaran la caída de frutos en niveles variables en función del manejo agronómico.

ARROZ

Para el presente trimestre, se esperan temperaturas máximas y mínimas superiores a su variabilidad climática en Tumbes y Piura; mientras que para Lambayeque se esperan condiciones diurnas ligeramente cálidas y nocturnas normales; este régimen de temperaturas serían favorables para la culminación de la campaña chica de arroz. En el caso del valle Chancay-Lambayeque la escasa disponibilidad de recurso hídrico en el reservorio Tinajones afectaría el inicio de la campaña de arroz. En la costa de Arequipa, se prevé problemas de estrés hídrico durante la fase de plántula y macollaje en las plantaciones de arroz.

MAPAS DE PRONÓSTICO CLIMÁTICO
Noviembre 2016 – Enero 2017

Temperatura Máxima



Temperatura Mínima



VID

Según el pronóstico trimestral, en Ica se esperan temperaturas máximas por encima de su variabilidad climática y temperaturas mínimas dentro y sobre su normal; las cuales favorecerían la formación de racimos y en algunas variedades el inicio de la maduración

PAPA Y MAIZ AMILACEO

En Cajamarca (sierra norte) se espera una mayor probabilidad de temperaturas máximas por encima de lo normal; así como temperaturas mínimas dentro de su variabilidad climática y con deficiencias de lluvias que podrían afectar la floración en el cultivo de papa. En Huancavelica y Cusco se prevé lluvias por encima de su normal, las cuales favorecerían la preparación de los terrenos agrícolas y el inicio de campaña de siembras en los cultivos de papa y maíz amiláceo.

QUINUA

Se prevé que en la zona circunlacustre del Altiplano se registren temperaturas máximas por encima de su variabilidad climática; así como una mayor probabilidad de ocurrencia de condiciones nocturnas normales y ligeramente frías. Por otro lado, se esperan lluvias dentro e inferiores a su normal histórica, estas lluvias podría ocasionar estrés hídrico durante los primeros estadíos de crecimiento en el cultivo de quinua.

Precipitación



Jr. Cahuíde Nº 785, Jesús María

Teléfono : 6141414, anexo 413

Consultas y sugerencias:

dga@senamhi.gob.pe