


PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO PAPA




Pronóstico Agrometeorológico

Del 04 al 13 de junio 2025

En la sierra central y sierra sur, la mayoría de las parcelas de papa manejadas bajo secano iniciaron el periodo de descanso estacional, por lo que no se prevén impactos significativos de las condiciones pluviométricas y térmicas previstas. Por otro lado, en las localidades de la vertiente oriental de la sierra central y sierra norte, el incremento de la disponibilidad hídrica favorecerá las labores de siembra, actividades agronómicas y el desarrollo de las plantaciones manejadas bajo riego.

En la franja costera central y sur, las condiciones térmicas previstas en torno a sus normales continuarán favorables para el desarrollo de la campaña chica 2025, propiciando la siembra, abonamiento, aporque y otras labores culturales oportunas, lo que favorecerá su rendimiento y el desarrollo de sus diferentes fases fenológicas. Sin no se descarta la aparición de problemas fitosanitarios asociados a la alta humedad, especialmente en zonas más próximas al litoral.



Mapa 1. Lluvias pronosticadas para los próximos 10 días

Próxima Actualización 13 de junio del 2025

Tener en cuenta

- El Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

3º DECADA DE MAYO 2025 (21 al 31)

Al 31 de mayo, en gran parte de la región andina, las parcelas de papa conducidos bajo secano se encuentran en descanso estacional, mayoritariamente; en tanto que, en localidades como Huancalpi (Huancavelica), Taraco y Tahuaco (Puno); Candarave (Tacna), algunos sembríos se encuentran en maduración y cosecha.

En cuanto a la franja costera sur, en las localidades como Aplao y La Joya (Arequipa) y Calientes (Tacna) los sembríos de papa se encuentran en crecimiento vegetativo y maduración; en tanto que, en las localidades de la costa central, los sembríos de papa se encuentran en siembra y crecimiento vegetativo.



Mapa 2. Etapas de crecimiento de la papa y su estado actual

Tener en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de papa observada al 31 de mayo 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador.

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

Impactos del clima

En la región andina, la mayoría de las parcelas conducidas en secano se encuentran en periodo de descanso estacional, por lo que las temperaturas diurnas cálidas y la prevalencia de un ambiente seco ($IH < 0,4$) no tuvieron impacto alguno. Por otro lado, para los campos que se encuentran en cosechas, dichas condiciones ambientales propiciaron la finalización de las labores de campo.

Para la campaña chica 2025 de los valles interandinos de la vertiente oriental, el incremento de humedad en la zona favoreció las labores de labranza y siembra; sin embargo, la alta demanda hídrica potencial ($ETP > 50$ mm) y las temperaturas cálidas, propias de la estación incrementaron las necesidades de riego, especialmente los campos en crecimiento vegetativo y floración. En cuanto a la humedad del suelo en secano, los datos de

las estaciones de Payhua (sierra de Lima), El Mantaro, Apata y Muqui (Junín); Camacani y Tahuaco (Puno) evidenciaron una tendencia a la baja, mostrando valores entre 10 % y 20 % de volumen. Por otro lado, la disminución de temperaturas nocturnas de zonas altoandinas fue favorable para las labores de postcosecha.

En la franja costera central y sur, las condiciones térmicas propias de la estación continuaron propicias para el desarrollo de las labores de siembra, emergencia y desarrollo vegetativo, favoreciendo el avance de la campaña chica 2025. Por el contrario, el incremento de humedad ambiental propició la aparición de enfermedades fitosanitarias asociadas, especialmente en zonas más próximas al litoral.

Variación Decadal del Índice de Humedad en la Sierra




Gráfico 1. Condiciones de disponibilidad hídrica de la última década (10 días)

Anomalías de la lluvia en la Sierra




Gráfico 2. Anomalia de lluvias de la última década (10 días)

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe



Ministerio
del Ambiente

