

# TENDENCIA AGROCLIMÁTICA PAPA



MARZO-MAYO 2018


## Tendencia

El pronóstico estacional para el próximo trimestre prevé condiciones de lluvia por encima de sus valores esperados en mayor ámbito del territorio nacional, asimismo se esperarían condiciones térmicas nocturnas cálidas.

Los cultivos de papa sembrados tardíamente, los cuales actualmente se encuentran en las fases de botón floral y floración tendrían humedad disponible y condiciones térmicas favorables para su crecimiento y desarrollo; sin descartar que localidades con mayor persistencia de humedad tendrían mayor probabilidad de incidencia de enfermedades como la rancha y la alternaria.

Los cultivos que se encuentran en la fase fenológica de maduración podrían ser afectados por la humedad, retrasando la cosecha y afectando el tubérculo.

Por otro lado, zonas de cultivo de papa que se encuentran en la fase de botón floral y floración podrían y donde se estiman lluvias deficitarias podrían ser afectadas por las primeras heladas de 2018 y por la disminución de lluvias que se iniciaría en abril; especialmente, si la variedad de papa es de periodo vegetativo largo.



## Tomar en cuenta

\* La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

Próxima Actualización 6 de abril de 2018