AÑO: VII

EDICIÓN VI

JUNIO

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO
JUNIO - AGOSTO
CULTIVO: PAPA

Fuente: andina.pe

Durante el trimestre comprendido entre junio y agosto de 2025, no se esperan precipitaciones en la costa, mientras que temperaturas diurnas y nocturnas se mantendrán entre valores inferiores a normales. En la sierra, se prevé que las precipitaciones oscilen entre inferiores y superiores, mientras que las temperaturas diurnas y nocturnas entre inferiores a superiores. Cabe indicar que, se prevén periodos secos en la sierra occidental.

COSTA CENTRAL Y SUR

Entre mayo y julio, persistirán las condiciones favorables para las labores de siembra, brotamiento de semillas, emergencia plántulas y el crecimiento vegetativo de las plantaciones instaladas, ya que se prevén temperaturas diurnas en torno a sus normales y las temperaturas nocturnas de normales a ligeramente frías, por lo que se estima un riesgo bajo. Asimismo, dichas condiciones permitirán la ejecución oportuna de aporques, abonamientos, riegos y otras labores culturales, sin descartar posibles impactos por la presencia de días cálidos y problemas fitosanitarios asociados a la alta humedad, especialmente en zonas más próximas al litoral.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ

SIERRA NORTE

De junio a agosto en las localidades de la sierra norte, la mayor parte de las parcelas conducidas en secano se encontraran en periodo de descanso estacional, por lo que no se prevén riesgo alguno. Para el desarrollo de la campaña chica conducidas bajo riego de la vertiente oriental, el incremento de humedad favorecido por las lluvias previstas de normales a superiores a su climatología promoverá el desarrollo vegetativo de las plantaciones instaladas, ejecución de labores de siembra y actividades agrícolas oportunas, por lo que se prevén niveles de riesgo entre medio y bajo. Sin descartar afectaciones por la presencia de plagas y enfermedades y un incremento de demanda de riego debido a la persistencia de días cálidos.

En las zonas productoras de la vertiente occidental, la prevalencia de condiciones secas, propias de la temporada aunadas a la presencia de días cálidos incrementará las necesidades de riego para los sembríos en curso (campaña chica), repercutiendo en el desarrollo normal de las plantaciones, por lo que los riesgos previstos podrían alcanzar hasta un nivel alto, sin descartar afectaciones por heladas en zonas de mayor altitud, olas de calor y otros eventos extremos de la época.

Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente

Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

Con Punche Perú

SIERRA CENTRAL

De junio a agosto, en las localidades de la vertiente occidental la mayoría de las parcelas en secano se encontraran en periodo de descanso estacional, por lo que no se prevén impactos importantes. Para las plantaciones manejadas bajo riego de la campaña chica 2025, es más probable que las necesidades hídricas se mantengan altas debido a la prevalencia de días cálidos y condiciones ambientales secas, por lo que los riesgos previstos incrementaran significativamente hasta un nivel alto. Sin descartar afectaciones por la helada, olas de calor y otros eventos extremos, especialmente en zonas de mayor altitud.

Por el contrario, para las localidades de la vertiente oriental, se esperaría que la humedad del suelo se mantengan favorable para la siembra, ejecución de las labores culturales oportunas y el desarrollo vegetativo de las plantaciones instaladas, por lo que se estiman niveles de riesgo entre medio y bajo. Sin embargo, se mantendrán las probabilidades de afectación por la granizada, heladas, granizadas, olas de calor y otros eventos extremos propios de la época, especialmente en las zonas de mayor altitud.

SIERRA SUR Y ALTIPLANO

Para el periodo junio-agosto, la mayoría de las parcelas manejadas en secano se encontrarán en periodo de descanso estacional, por lo que no se tendrían impactos significativos, especialmente en los sectores de la sierra sur oriental y el altiplano.

Sin embargo, para las localidades de la vertiente oriental, la prevalencia de lluvias de normales a superiores favorecerá la ejecución de labores de labranza, siembra y el desarrollo vegetativo de las plantaciones instaladas bajo riego. Por el contrario, para los valles interandinos de la sierra sur occidental, la alta radiación incrementará las necesidades de riego; al mismo tiempo que, no se descartaría afectaciones por la helada, olas de calor y otros eventos extremos de corta duración.




N
W
E
S
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
80°0'0"W
75°0'0"W
70°0'0"W
Riesgo agroclimático
Julio 2025
Limite provincial
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE PAPA
ESCALA: 1:8324685
ELABORACIÓN:
DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLOGÍA SENAMHI
MAPA N°


N
W
E
S
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
80°0'0"W
75°0'0"W
70°0'0"W
Riesgo agroclimático
Agosto 2025
Limite provincial
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE PAPA
ESCALA: 1:8324685
ELABORACIÓN:
DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLOGÍA SENAMHI
MAPA N°

TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Julio 2025