

BOLETÍN DE PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO DEL CULTIVO DE VID VALLE DE ICA

MES DE SEPTIEMBRE

DZ5 - ICA



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

RIESGO



AGROCLIMÁTICO




CULTIVO DE VID



El manejo agrícola de los cultivos de Vid en el valle de Ica es en un mayor porcentaje tecnificados (uva de exportación) de las variedades Red Globe, Flame Seedles, Superior Seedles, Thompson Seedles, Crimpson Seedles, Alfonso Lavalle, Petit Verdot; los pequeños agricultores usan su propia tecnología y manejo conduciendo variedades tradicionales como quebranta, Italia, moscatel. Usan plantones certificados en diversas variedades de producción, para uva de mesa y para elaboración de vinos; se suma a estas condiciones el tipo de suelo franco arenoso en zonas desérticas y con clima seco típico de las zonas costeras del Perú.

No obstante, estos factores de vulnerabilidad, no contribuyen a que los riesgos agroclimáticos representen una amenaza, para el rendimiento de los cultivos

Para el pronóstico de riesgo agroclimático del cultivo de vid variedad Petit Verdot, se determina en el valle de Ica Región de Ica.




VALLE DE ICA



BOCATOMA LA ACHIRANA

RED DE ESTACIONES DE MONITOREO



Elaborado por: Área de Agrometeorología

RIESGO




AGROCLIMÁTICO



CULTIVO DE VID



Figura 2 – MAPA DE PRONÓSTICO DE RIESGO



RIESGO AGROCLIMÁTICO

CATEGORIA	PORCENTAJE (%)	GRADO DE AFECTACION AL CULTIVO	RENDIMIENTO DEL CULTIVO
Muy Bajo	53.80	Sin Afección	Superior a su promedio
Bajo	44.36	Ligeramente Afectado	Ligeramente a su promedio
Medio	1.26	Moderadamente Afectado	Dentro de lo esperado
Alto	0.44	Fuertemente Afectado	Inferior a su promedio
Muy Alto	0.13	Totalmente Afectado	Pérdida

Tabla N° 01- Elaborado por el Área de Agrometeorología

ANÁLISIS DE RIESGO

El riesgo agroclimático se presentaría según el rango de riesgo de 53.80% muy bajo y 44.36% bajo, ubicados en la zona sur y norte del valle de Ica, esto se debe a que de acuerdo al pronóstico de las condiciones climáticas para el mes de septiembre las temperaturas máximas y mínimas se encontrarían sobre su normal, esto podría afectar en la producción de las variedades de exportación.

No se descartaría un incremento de plagas y enfermedades entre otros problemas fitosanitarios. Por lo que se recomienda tomar medidas de prevención sanitaria y aplicaciones preventivas.

MONITOREO FENOLÓGICO DE LA VID

VALLE DE ICA															
MONITOREO DEL CULTIVO DE VID															
ESTACIÓN TACAMA: FASES FENOLOGICAS DE LA VID - PETIT VERDOT															
ESTACIÓN	ZONA	FASES FENOLOGICAS	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	
LAS VIÑAS	TINGUIÑA	REPOSO VEGETATIVO													
		HINCHAZON DE YEMAS													
		APERTURA DE YEMAS													
		APARICION DEL AMENTO													
		FLORACION													
		FRUCTIFICACION													
MADURACIÓN															

					
↑ HINCHAZON DE YEMAS	↑ APERTURA DE YEMAS	↑ APARICION DEL AMENTO	↑ FLORACIÓN	↑ FRUCTIFICACIÓN	↑ MADURACIÓN



ESTACIÓN TACAMA
FASE FENOLÓGICA: REPOSO VEGETATIVO

AVISOS MES DE JULIO



Durante los eventos de incremento de vientos en la costa, durante el mes de agosto no se presentaron impactos negativos al cultivo ya que éste se encuentra en reposo vegetativo en variedades viníferas, mientras que en variedades de exportación se mantiene controlado las plagas y enfermedades.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL SENAMHI

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
GUILLERMO ANTONIO BAIGORRIA PAZ

DIRECTOR DE AGROMETEROLOGÍA

Constantino Alarcón Velazco

SUB DIRECTORA DE PREDICCIÓN AGROMETEROLOGÍA:

Ing. Carmen Reyes Bravo

DIRECTOR ZONAL 5

Ing. Ricardo Rosas Lujan

RESPONSABLE DE EDICIÓN

Ing. Christian Espinoza Sarmiento

Ing. Rossmery Alata Huisa

Teléfono : 056 - 228902 Cel: 956 849 945

E-Mail : dr05ica@senamhi.gob.pe

Página web: ica.senamhi.gob.pe

Facebook : [senamhiica](https://www.facebook.com/senamhiica)