PERÚ Ministerio del Ambiente

Senamhi
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ

Perú

BOLETÍN CLIMÁTICO NACIONAL

AGOSTO 2025

Monitoreo y pronóstico del clima

Presentación

El SENAMHI brinda a tomadores de decisiones, planificadores, agricultores, medios y a la población en general, una síntesis útil y oportuna de las condiciones climáticas de lluvias y temperaturas a nivel nacional. Incluimos las previsiones para los próximos tres meses.

TOMA EN CUENTA

TIEMPO:
Refleja las condiciones atmosféricas instantáneas.

CLIMA:
Refleja las mismas condiciones atmosféricas en meses, años y décadas.

SISTEMA DE ALERTA DE EL NIÑO Y LA NIÑA

NO ACTIVO:
En condiciones neutras o cuando El Niño o La Niña están por finalizar.

VIGILANCIA DE LA NIÑA COSTERA:
Cuando se estima que es más probable que ocurra.

VIGILANCIA DE EL NIÑO COSTERO:
Cuando es más probable que ocurra.

ALERTA DE LA NIÑA COSTERA:
Cuando se ha iniciado o se espera que se consolide.

ALERTA DE EL NIÑO COSTERO:
Cuando se ha iniciado o se espera que se consolide.

Más información: Comunicado ENFEN
(Link: https://www.gob.pe/9297-fenomeno-el-nino)

SUSCRIBETE AL BOLETÍN CLIMÁTICO:
http://bit.ly/2EKqsHX

NORMALES CLIMÁTICAS 1991-2020
(link:: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=normales-estaciones)

1. Condiciones climáticas en el mes de agosto

En agosto 2025, la región andina registró un comportamiento de lluvia dentro de lo habitual, con algunas deficiencias en la selva norte alta (San Martín), debido a la baja concentración de humedad y vientos del oeste intensificados en niveles altos de la tropósfera (250hPa) en la región sur y parte de la región central del país. En contraste, se presentaron lluvias en la sierra norte oriental (Cajamarca, Lambayeque), parte de Amazonas, Loreto y zonas puntuales en Huánuco, sur de Junín y Huancavelica, favorecidas por mayores condiciones de humedad y flujos del este en niveles medios (500 hPa) y altos (250 hPa) de la tropósfera, principalmente hacia la región norte del Perú.

Las temperaturas máximas fueron normales en la mayor parte del país; con algunas anomalías positivas superiores a 2°C en sectores localizados de la costa central, sierra occidental y centro-sur de San Martín, mientras que anomalías negativas se presentaron en la selva sur, sierra central oriental y norte de Cajamarca. Las temperaturas mínimas se mantuvieron dentro de lo normal en la mayor parte del país, con breves episodios cálidos (de 4 a 6 noches cálidas) en la costa (La Libertad), la sierra central, sierra sur y la selva, mientras que los descensos fríos fueron puntuales y solo se registraron al inicio del período en el centro y sur del país.

Respecto a las condiciones oceánicas y su influencia climática, el ENFEN mantiene el Estado del Sistema de Alerta ante El Niño costero / La Niña costera en “No Activo” para la región Niño 1+2 (costa norte y centro del país). La condición neutra continuará hasta abril de 2026, con una tendencia a disminuir hacia el final de este período. En el Pacífico Central (región Niño 3.4), se prevé que la condición neutra continúe en los próximos meses, sin embargo, la probabilidad de condiciones frías se incrementaría entre lo que resta del invierno y primavera, alcanzando una máxima probabilidad en noviembre. (COMUNICADO OFICIAL ENFEN N°09-2025).

2. Análisis de las temperaturas extremas del aire a nivel nacional

2. 1 TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE

Variación de la temperatura máxima del aire en el territorio nacional durante el mes de agosto.

Tabla 1. Variaciones de la temperatura máxima en la costa

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n.m.)
Costa norte	18.8°C (Trujillo - La Libertad)	44	35.0°C (Tumbes - Tumbes)	68
Costa centro	13.7°C (Huaura - Lima)	416	29.4°C (Cañete - Lima)	684
Costa sur	14.6°C (Tacna - Tacna)	560	31.4°C (Palpa - Ica)	340

Tabla 2. Variaciones de la temperatura máxima en la sierra

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Sierra norte	13.0°C (Huancabamba - Piura)	2974	35.5°C (Jaén - Cajamarca)	618
Sierra central	9.5°C (Pasco - Pasco)	4357	31.0°C (Palpa - Ica)	1020
Sierra sur	8.6°C (Tacna - Tacna)	4625	33.4°C (General Sanchez Cerro - Moquegua)	1765

Tabla 3. Variaciones de la temperatura máxima en la selva

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALT (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALT (m s. n. m.)
Selva norte	17.4°C (Chachapoyas - Amazonas)	2442	38.8°C (Picota - San Martín)	238
Selva central	13.0°C (Huánuco - Huánuco)	2540	36.9°C (Padre Abad - Ucayali)	216
Selva sur	15.7°C (Urubamba - Cusco)	2399	37.4°C (Tahuamanu - Madre De Dios)	244

Distribución de las anomalías de la temperatura máxima

En agosto, se presentaron condiciones cálidas de mayor destaque en algunas regiones como Tumbes con anomalías superiores a +3.0°C; entre las estaciones meteorológicas que registraron las anomalías más altas se tiene a Rica Playa (Tumbes, +3.4°C), El Salto (Tumbes, +3.1°C), seguido de valores menores a +3.0°C como Ñaña (Lima, +2.8°C), La Haciendita (Arequipa, +2.5°C) entre otros.

Las anomalías negativas más bajas (menores a -1.2°C) de temperatura máxima se presentaron en las estaciones meteorológicas de Chontalí (Cajamarca, -2.1°C), Quincemil (Cusco, -1.7°C), Satipo (Junín, -1.5°C), Jepelacio (San Martín, -1.4°C) y Namballe (Cajamarca, -1.3°C) .

MAPA 1
ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE AGOSTO 2025



TOMA EN CUENTA

ANOMALÍA:
Diferencia del valor observado, respecto al promedio mensual 1991-2020

Tabla 4. Anomalías positivas de temperatura máxima del aire de mayor magnitud para algunas localidades del país observadas durante agosto.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Tumbes	Tumbes	68	Rica Playa	+3.4
	Tumbes	Zarumilla	4	El Salto	+3.1
	Tumbes	Zarumilla	50	Papayal	+2.2
	Tumbes	Tumbes	6	La Cruz	+1.1
	Piura	Paita	7	La Esperanza	+1.1
Costa central	Lima	Lima	543	Ñaña	+2.8
	Ancash	Huarmey	8	Huarmey	+2.1
Costa sur	Arequipa	Islay	267	La Haciendita	+2.5
	Tacna	Jorge Basadre	160	Ite	+1.3
Sierra norte	Piura	Ayabaca	2648	Ayabaca	+2.2
	La Libertad	Sanchez Carrión	3186	Huamachuco	+2.1
	Cajamarca	Jaén	1804	Sallique	+1.8
	Cajamarca	Chota	1653	Cochabamba	+1.6
	Cajamarca	Chota	1399	Tocmoche	+1.5
Sierra central	Ancash	Pallasca	3364	Cabana	+2.1
	Ancash	Huari	3140	Chavin	+2.1
	Lima	Canta	2818	Canta	+1.9
	Huancavelica	Acobamba	3399	Acobamba	+1.8
Sierra sur	Ayacucho	Lucanas	3176	Puquio	+2.3
	Ayacucho	Sucre	3232	Paucaray	+2.3
	Cusco	Quispicanchi	3681	Ccatcca	+2.2
	Puno	San Román	3885	Cabanillas	+2.2
	Puno	Lampa	3866	Lampa	+1.8
	Puno	Puno	3825	Puno	+1.7
	Puno	Azángaro	3932	Muñani	+1.6
	Apurimac	Aymaraes	2964	Aymaraes	+1.6
	Arequipa	Caravelí	1033	Chaparra	+1.5
Selva norte	San Martín	Bellavista	282	Jose Olaya	+2.2
	San Martín	Picota	238	Tingo De Ponaza	+2.1
	San Martín	Huallaga	307	Saposoa	+1.9
	San Martín	El Dorado	420	Alao	+1.8
	San Martín	Tocache	480	Tananta	+1.7
	San Martín	Rioja	823	Rioja	+1.5
Selva central	Huánuco	Puerto Inca	212	Puerto Inca	+1.1
	Huánuco	Leoncio Prado	1672	La Divisoria	+0.5
Selva sur	Ayacucho	Huamanga	2470	Wayllapampa	+1.7
	Ayacucho	Huanta	2485	Huanta	+1.4

Tabla 5. Anomalías negativas de temperatura máxima del aire de mayor magnitud para algunas localidades del país observadas durante agosto 2025.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Tumbes	Tumbes	6	Puerto Pizarro	-0.6
Costa centro	Lima	Huaura	59	Camay	-0.8
Costa sur	Ica	Palpa	340	Palpa	-0.4
Sierra norte	Cajamarca	Jaén	1627	Chontalí	-2.1
	Cajamarca	San Ignacio	722	Namballe	-1.3
	Cajamarca	Cajamarca	2270	Asunción	-1
Sierra centro	Junín	Jauja	3674	Ricran	-1.1
	Junín	Chupaca	3833	Laive	-1
Sierra sur	Arequipa	Castilla	3065	Chachas	-1.2
	Tacna	Candarave	3386	Cairani	-1.2
	Arequipa	Castilla	2432	Choco	-1
Selva norte	San Martín	Moyobamba	1057	Jepelacio	-1.4
Selva central	Junín	Satipo	577	Satipo	-1.5
Selva sur	Puno	Carabaya	666	San Gabán	-2
	Cusco	Quispicanchi	651	Quincemil	-1.7

2.2 TEMPERATURA MÍNIMA DEL AIRE

Variación de la temperatura mínima del aire en el territorio nacional durante el mes de agosto 2025.

Tabla 6. Variaciones de la temperatura mínima en costa

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Costa norte	11.7°C (Lambayeque - Lambayeque)	124	22.6°C (Zarumilla - Tumbes)	4
Costa central	11.2°C (Huaura - Lima)	131	17.4°C (Huarmey - Ancash)	8
Costa sur	4.6°C (Ica - Ica)	311	16.4°C (Chincha - Ica)	71

Tabla 7. Variaciones de la temperatura mínima en sierra

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Sierra norte	0.1°C (Cajamarca - Cajamarca)	3149	24.4°C (Mariscal R. Castilla - Loreto)	75
Sierra central	-9.1°C (Chupaca - Junín)	3833	16.8°C (Palpa - Ica)	1020
Sierra sur	-20.6°C (Tarata - Tacna)	4250	14.2°C (Jorge Basadre - Tacna)	1425

Tabla 8. Variaciones de la temperatura mínima en selva

SECTOR	VALOR MÍNIMO	ALTURA (m s. n. m.)	VALOR MÁXIMO	ALTURA (m s. n. m.)
Selva norte	5.4°C (Chachapoyas - Amazonas)	2442	24.4°C (Mariscal Ramon Castilla - Loreto)	75
Selva central	4.6°C (Pachitea - Huánuco)	3032	24.3°C (Puerto Inca - Huánuco)	196
Selva sur	0.4°C (Huamanga - Ayacucho)	2470	25.0°C (Tambopata - Madre De Dios)	209

Distribución de las anomalías de la temperatura mínima

En agosto, las anomalías de las temperaturas mínimas alcanzaron valores inferiores a -2°C en algunas estaciones meteorológicas de la sierra norte y sierra sur, entre ellas Sallique (Cajamarca, -2.5°C), Desaguadero (Puno, -2.9°C), Madrigal (Arequipa, -2.7°C) y Pisac (Cusco, -2.2°C). En contraste, las anomalías positivas superiores a +2.5°C, se registraron en estaciones meteorológicas de la sierra sur como Carumas (Moquegua, +2.7°C), Progreso (Puno, +2.6°C) y en el sector de la sierra central en Pampas (Huancavelica, +2.6°C).

MAPA 2
ANOMALÍAS DE LA TEMPERATURA MÍNIMA DURANTE AGOSTO 2025



TOMA EN CUENTA

ANOMALÍA:
Diferencia del valor observado, respecto al promedio mensual 1991-2020.

Las Tablas 9 y 10 presentan algunas localidades donde se registraron las anomalías positivas y negativas de mayor magnitud.

Tabla 9. Anomalías positivas de temperatura mínima del aire de mayor magnitud durante agosto.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Lambayeque	Lambayeque	78	Jayanca	+1.6
	La Libertad	Pacasmayo	117	Talla (Guadalupe)	+1.3
Costa central	Lima	Huaura	59	Camay	+1.4
Costa sur	Moquegua	Ilo	60	Ilo	+1.8
Sierra norte	Cajamarca	Santa Cruz	1638	Chancay Baños	+2.4
	La Libertad	Sanchez Carrion	3186	Huamachuco	+1.9
	Cajamarca	San Ignacio	1243	San Ignacio	+1.7
Sierra central	Huancavelica	Tayacaja	3250	Pampas	+2.6
	Ancash	Pomabamba	2985	Pomabamba	+2.5
	Lima	Huarochiri	3758	San Lazaro De Escomarca	+2.3
Sierra sur	Moquegua	Mariscal Nieto	3055	Carumas	+2.7
	Puno	Azángaro	3925	Progreso	+2.6
	Apurímac	Aymaraes	2964	Aymaraes	+2.5
	Cusco	Urubamba	2850	Urubamba	+2.0
	Cusco	Anta	3324	Anta Ancachuro	+2.0
Selva norte	San Martín	Moyobamba	1057	Jepelacio	+1.8
	Loreto	Alto Amazonas	142	San Ramon	+1.5
Selva central	Pasco	Oxapampa	1801	Oxapampa	+2.1
Selva sur	Madre De Dios	Tahuamanu	244	Iñapari	+1.2

Tabla 10. Anomalías negativas de temperatura mínima del aire de mayor magnitud durante agosto .

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (°C)
Costa norte	Piura	Sullana	44	Mallares	-0.9
Sierra norte	Cajamarca	Jaén	1804	Sallique	-2.5
	La Libertad	Otuzco	3418	Salpo	-1.1
Sierra centro	Lima	Yauyos	3832	Vilca	-2
	Ancash	Recuay	1228	Chamana	-1.9
	Huancavelica	Castrovirreyna	2736	Huachos	-1.6
	Huancavelica	Castrovirreyna	1856	San Juan De Castrovirreyna	-1.6
	Huancavelica	Huaytara	3263	Cusicancha	-1.6
Sierra sur	Puno	Chucuito	3833	Desaguadero	-2.9
	Arequipa	Caylloma	3276	Madrigal	-2.7
	Cusco	Calca	2990	Pisac	-2.2
	Arequipa	Castilla	3093	Machahuay	-1.8
	Puno	Puno	3939	Laraqueri	-1.8
	Puno	Melgar	3957	Santa Rosa	-1.7
Selva norte	San Martín	San Martin	203	Chazuta	-1
Selva central	Huánuco	Pachitea	3032	Chaglla	-0.9
Selva sur	Ayacucho	Huanta	2485	Huanta	-1.5
	Puno	Carabaya	666	San Gaban	-0.8

3. Comportamiento de las lluvias a nivel nacional

En agosto de 2025 se registraron superávits de precipitación superiores al 400% en zonas localizadas de Lambayeque y Cajamarca, mientras que en Loreto, el norte de San Martín, el norte de Huánuco, así como en áreas puntuales de Ayacucho, Apurímac y la selva sur, los valores oscilaron entre 60% y 400%. En contraste, se observaron anomalías negativas de entre -30% y -100% en la zona andina central y sur, como parte de su temporada seca. Asimismo, en la selva norte alta (San Martín), algunas estaciones como Huayabamba, Picota y San Pablo también registraron déficit de lluvias notables. Para más información revisar aquí.

MAPA 3
ANOMALÍAS DE LA PRECIPITACIÓN DURANTE AGOSTO 2025



Mayores deficiencias de precipitación, en términos porcentuales (por debajo de su variabilidad normal[1]), se presentaron en:

Tabla 11. Deficiencias de precipitación en algunas localidades del país, durante agosto.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (%)
Costa norte	Tumbes	Zarumilla	62	Matapalo	-84.0%
Costa central	Lima	Huaura	45	Unjf Sanchez Carrion - Huacho	-99.2%
Costa sur	Moquegua	Ilo	25	Punta Coles	-99.4%
Sierra norte	Piura	Huancabamba	2142	Porculla	-100.0%
	Piura	Ayabaca	3080	Alto De Poclus	-100.0%
	Cajamarca	San Pablo	2325	San Pablo	-100.0%
	La Libertad	Santiago De Chuco	2708	Mollepata	-100.0%
	La Libertad	Santiago De Chuco	2892	Cachicadan	-93.6%
	La Libertad	Sanchez Carrión	3770	Huangacocha	-91.7%
Sierra central	Huánuco	Huánuco	1986	Canchan	-100.0%
	Ancash	Pallasca	3364	Cabana	-100.0%
	Ancash	Aija	3486	Aija	-100.0%
	Lima	Cajatambo	3432	Cajatambo	-100.0%
	Lima	Huarochirí	3188	Sheque	-100.0%
Sierra sur	Puno	Lampa	3866	Lampa	-100.0%
	Puno	Puno	3819	Los Uros	-100.0%
	Cusco	Paucartambo	2931	Paucartambo	-100.0%
	Moquegua	General Sanchez Cerro	3381	Ubinas	-100.0%
	Cusco	Quispicanchi	3681	Ccatcca	-100.0%
	Ayacucho	Lucanas	3176	Puquio	-100.0%
	Cusco	Canchis	3534	Sicuani	-100.0%
	Puno	Carabaya	4128	Crucero	-100.0%
	Ayacucho	Lucanas	3350	Lucanas	-100.0%
	Ayacucho	Parinacochas	3149	Coracora	-100.0%
	Arequipa	Castilla	2432	Choco	-100.0%
	Arequipa	Caylloma	3312	Huambo	-100.0%
Selva norte	San Martín	Mariscal Caceres	285	Huayabamba	-68.6%
	San Martín	Picota	220	Picota	-66.8%
	San Martín	Bellavista	270	San Pablo	-66.5%
	Loreto	Alto Amazonas	142	San Ramon	-58.6%
Selva central	Huánuco	Pachitea	3032	Chaglla	-74.8%
	Junín	Satipo	577	Satipo	-71.7%
Selva sur	Apurímac	Chincheros	2021	Pampas	-100.0%
	Madre De Dios	Tambopata	209	Puerto Maldonado	-61.1%

[1] En la región andina tropical, la variabilidad normal de las lluvias oscila en un rango de +/- 15% (SENAMHI, 2012)

Excesos de mayor magnitud, en términos porcentuales (por encima de su variabilidad normal[1]), se presentaron en:

Tabla 12. Excesos de precipitación en algunas localidades del país durante agosto.

SECTOR	DPTO	PROV	ALT (m s. n. m.)	ESTACIÓN	ANOMALÍA (%)
Costa norte	Lambayeque	Chiclayo	182	Tinajones	4966.7%
Costa central	Lima	Lima	123	Campo De Marte	115.8%
Costa sur	Tacna	Tacna	30	La Yarada	70.0%
Sierra norte	Cajamarca	Jaén	1804	Sallique	595.7%
	Cajamarca	Chota	2096	Llama	481.8%
	Cajamarca	Jaén	1110	El Limon	458.3%
	Piura	Huancabamba	1917	Sondorillo	371.4%
	Cajamarca	San Miguel	2424	Niepos	298.2%
	Lambayeque	Ferreñafe	3052	Incahuasi	286.3%
	Cajamarca	Jaén	1627	Chontali	209.4%
	Cajamarca	Cutervo	2668	Cutervo	196.4%
	Cajamarca	San Ignacio	1902	Tabaconas	195.2%
	Piura	Huancabamba	1959	Huancabamba	192.8%
	Lambayeque	Ferreñafe	3300	Cueva Blanca	186.2%
	Cajamarca	Cajamarca	2760	Namora	169.5%
Sierra central	Huancavelica	Tayacaja	3250	Pampas	311.3%
	Junín	Chupaca	3660	San Juan De Jarpa	240.7%
	Junín	Yauli	4094	Yauli	237.9%
	Huancavelica	Tayacaja	3005	Salcabamba	148.4%
	Huancavelica	Tayacaja	3603	Acostambo	110.5%
	Huancavelica	Angaraes	3303	Lircay	109.8%
	Pasco	Pasco	4357	Cerro De Pasco	104.0%
	Huancavelica	Huancavelica	3586	Pilchaca	91.6%
Sierra sur	Apurímac	Grau	3535	Curpahuasi	119.4%
	Ayacucho	Victor Fajardo	3117	Huancapi	94.0%
	Arequipa	Caylloma	4396	Porpera	37.1%
	Apurímac	Cotabambas	3279	Tambobamba	32.2%
Selva norte	Loreto	Alto Amazonas	120	Lagunas	333.0%
	Loreto	Requena	104	Tamanco	246.1%
	Amazonas	Utcubamba	1467	El Palto	214.3%
	Loreto	Maynas	113	Amazonas	167.5%
	Amazonas	Utcubamba	1173	Jamalca	163.3%
Selva central	Ucayali	Padre Abad	316	Aguaytia	107.9%
	Huánuco	Leoncio Prado	586	Aucayacu	62.7%
Selva sur	Cusco	Quispicanchi	651	Quincemil	117.7%
	Puno	Carabaya	666	San Gaban	57.8%
	Madre De Dios	Tahuamanu	244	Iñapari	32.6%

4. Previsiones Estacionales para el trimestre Septiembre – Noviembre 2025

4. 1 PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÁXIMAS DEL AIRE

Para el trimestre Septiembre – Noviembre 2025, las temperaturas máximas se mantendrán dentro de sus rangos normales en la franja costera, sierra norte oriental, selva central, selva sur y selva norte baja; mientras que en la sierra centro y sur se anticipan valores superiores a lo normal. En la sierra norte occidental y la selva norte alta, las temperaturas máximas oscilarán entre condiciones normales y superiores.

MAPA 4
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE TEMPERATURA MÁXIMA (%) PARA EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2025



Para ver más información acerca del pronóstico climático **clic aquí.**

* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

4. 2 PREVISIÓN ESTACIONAL DE TEMPERATURAS MÍNIMAS DEL AIRE

Para el trimestre septiembre - noviembre 2025 en las temperaturas mínimas, se esperan valores por encima de lo normal en la selva norte, la sierra norte oriental y la sierra centro oriental; en tanto que, en la costa, sierra centro occidental, sierra sur, selva central y selva sur se mantendrán dentro de sus rangos normales. En la sierra norte occidental oscilarían entre normales y superiores.

MAPA 5

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE TEMPERATURA MÍNIMA (%) PARA EL TRIMESTRE SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2025



Para ver más información acerca del pronóstico climático **clic aquí**.

* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

4. 3 PREVISIÓN ESTACIONAL DE LLUVIAS

Para el trimestre septiembre a noviembre 2025, se esperan condiciones normales en la costa, sierra centro oriental, sierra sur oriental, selva central y selva sur; valores inferiores a lo normal en la sierra sur occidental; condiciones normales y superiores en la sierra norte oriental y selva norte; y entre normales e inferiores en la sierra norte occidental y la sierra centro occidental, sin descartar la ocurrencia de lloviznas o garúas en el litoral costero, particularmente en los ecosistemas de lomas

MAPA 6
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE LLUVIAS (%)
SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2025



Para ver más información acerca del pronóstico climático **clic aquí.**

* Estos pronósticos NO estiman los valores extremos diarios, sino que representan los valores medios de tres meses.

Dirección de Meteorología y Evaluación Ambiental Atmosférica:
Julio Urbiola jurbiola@senamhi.gob.pe
Subdirección de Predicción Climática :
Grinia Ávalos gavalos@senamhi.gob.pe

Análisis y redacción:
Lenin Suca lsuca@senamhi.gob.pe
Anabel Castro acastro@senamhi.gob.pe
Javier Chiong jchiong@senamhi.gob.pe

Encuentra los ÚLTIMOS AVISOS METEOROLÓGICOS en este link: http://www.senamhi.gob.pe/avisos

Para estar permanentemente informado sobre la EVOLUCIÓN DIARIA DE LA LLUVIAS Y LAS TEMPERATURAS A NIVEL NACIONAL, visita este link: https://www.senamhi.gob.pe/?&p=estaciones

Próxima actualización: 08 de octubre de 2025

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI
Jr. Cahuide 785, Jesús María
Lima 11 - Perú

Central telefónica: [51 1] 614-1414
Atención al cliente: [51 1] 470-2867
Pronóstico: [51 1] 614-1407 anexo 407
Climatología: [51 1] 614-1414 anexo 475

Consultas y sugerencias:
clima@senamhi.gob.pe