



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú - SENAMHI

DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLGÍA



PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO CUENCAS DE LOS RÍOS CHIRA-PIURA

AGOSTO - SETIEMBRE - OCTUBRE 2017
Vol 01- N° 5

I.- Presentación

En nuestro país la producción agropecuaria tiene lugar en el sistema suelo-cultivo-atmósfera, por lo que se encuentra expuesta a las condiciones meteorológicas. El nivel de riesgo se caracteriza por ser dinámico y cambiante de acuerdo con las variaciones que sufren sus componentes en el tiempo y en el espacio, lo que requiere el monitoreo y la actualización continua de los datos, por ello, la prevención y la mitigación de riesgos se aceptan como prioridades, pero hasta el momento no se observa suficiente información geográfica integrada y a escalas apropiadas para la evaluación y el análisis de la vulnerabilidad de cada zona. Para corregir esta situación los mapas de riesgos son un importante instrumento que permite, entre otras decisiones, asignar recursos al desarrollo de actividades productivas en aquellas zonas en las que se pueda expresar su mayor potencial con la menor exposición a riesgos posibles, por lo que constituyen una herramienta imprescindible para el ordenamiento territorial.

Por tal razón se elabora **el pronóstico de riesgo agroclimático del cultivo de arroz en el ámbito de las cuencas de los ríos Chira-Piura.**

En el presente boletín se presenta la probabilidad de riesgo agroclimático para el cultivo de arroz instalado las cuencas de los ríos Chira y Piura, en sus diferentes etapas fenológicas. El riesgo agroclimático se evalúa en función a las amenazas climáticas probables que se podrían presentar en estos lugares, así como los factores de vulnerabilidad que se presentan en tiempo y espacio, se manifiesta en la productividad de los diferentes cultivos priorizados.

La superficie con cultivo bajo riego regulado en Piura se sitúa alrededor de 193 682 ha principalmente en los Valles del Medio y Bajo Piura, San Lorenzo y Valle del Chira. Según el resultado final de la encuesta de intenciones de siembra del cultivo de arroz para la campaña agrícola 2017-2018, el MINAGRI consigna un total de 63 768 hectáreas.

En la región Piura en los principales valles arroceros se tiene previsto para la presente campaña agrícola 2017-2018 (campaña chica), sembrar aproximadamente 17 100 has distribuidas en 3 200 has en el valle del bajo Piura, 9 400 has en el valle del chira y 4 500 en el valle de San Lorenzo; según la Dirección Regional de Agricultura, lo cual es inferior a lo programado de acuerdo a la encuesta de intenciones de siembra 2017-2018 debido a la incertidumbre por el bajo rendimiento obtenido en la campaña grande anterior 2016-2017.

II.- Tomar en cuenta

CLIMA: Es el estado medio del tiempo, una descripción del conjunto de condiciones atmosféricas como precipitación, temperatura, humedad relativa, etc., en términos de valores medios que caracterizan una región durante un periodo representativo de 30 a más años. Por su parte, la variabilidad climática es una fluctuación del clima e indica las variaciones naturales comunes de un año al siguiente o cambios de una década a la siguiente. La variabilidad del clima se refiere a las variaciones en el estado promedio y otros datos estadísticos (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, etc.) del clima en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos meteorológicos determinados. (Plan GRACC-A. Numeral 1.1. Marco Conceptual).

RIESGO AGROCLIMÁTICO: Es la probabilidad de que ocurran pérdidas en la producción agropecuaria debido a fenómenos climáticos. Sus componentes son la amenaza y la vulnerabilidad.

AMENAZA: Es un fenómeno que se produce cuando los factores climáticos o externos al cultivo (lluvias y temperaturas) presentan valores superiores o inferiores a los promedios normales e impactan en el desarrollo de los cultivos.

VULNERABILIDAD: Son las características internas del cultivo que los hacen fuertes o susceptibles a los daños de una amenaza. Sus componentes son la exposición, susceptibilidad y resiliencia.

SUSCEPTIBILIDAD: Es el grado de debilidad del cultivo para enfrentar la adversidad climática en sus diferentes etapas de desarrollo.

EXPOSICIÓN: Es la ubicación del cultivo que determina que tan expuesto se encuentra ante la amenaza climática. Comprende piso agroclimático, época del año, textura, pendiente, capacidad de retención del suelo, zonas propensas a erosión, inundaciones, deslizamientos, etc.

RESILIENCIA: Es la capacidad de recuperación del cultivo, por medio de prácticas de manejo que poseen los agricultores, para enfrentar las situaciones climáticas adversas. Por ejemplo, el uso de semillas certificadas, infraestructura de riego, etc.

FASE FENOLÓGICA: Es el período durante el cual aparecen, se transforman o desaparecen los órganos de las plantas. Por ejemplo, para el maíz: emergencia, aparición de hojas, panoja, espiga, maduración lechosa, maduración pastosa y maduración córnea.

EVAPOTRANSPIRACIÓN (ETo): Es la suma del agua transpirada a través de los estomas de las plantas y el agua que se evapora desde el suelo o cubierta vegetal hacia la atmósfera, y se expresa en unidades por lamina por unidad de tiempo; cm/mes, mm/día.


PRONÓSTICO METEOROLÓGICO: Es la estimación del estado futuro de la atmósfera en base a las condiciones meteorológicas actuales.

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO DEL CULTIVO DE ARROZ (*Oryza sativa*. L) INSTALADO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CHIRA-PIURA


Resumen

Para el trimestre **ago-set-oct** de la campaña agrícola 2017-2018, el riesgo agroclimático esperado para el cultivo de arroz varía de 5% a 20%, estos valores se encuentran dentro de las categorías de riesgo muy bajo a bajo, concentrándose los mayores porcentajes de riesgo en la cuenca del río Piura específicamente en la parte este de las cuencas. Actualmente nos encontramos iniciando la campaña agrícola 2017-2018 (campaña chica), por lo que el cultivo en casi la totalidad del área se encuentra en emergencia y plántula, teniéndose programado como último día para el trasplante el 12 de agosto.

RIESGO AGROCLIMÁTICO PARA EL CULTIVO DE ARROZ INSTALADO EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS CHIRA-PIURA



Para el trimestre ago-set-oct, el riesgo agroclimático para el cultivo de arroz se estaría presentando de categoría de muy bajo a bajo, por lo que el cultivo no sería afectado significativamente ya que cuenta con disponibilidad hídrica, también la temperatura es propicia para las fases de almácigo y plántula.



Para el trimestre ago-set-oct, el porcentaje de riesgo agroclimático para el cultivo de arroz registra una variación de 5% a 20%. Si bien es cierto las temperatura máximas y mínimas se estarían comportando de acuerdo a su normal climatológica, excepto al Este de las cuencas en que ambas temperaturas serian superiores, en algunos valles como San Lorenzo existen almácigos que aún no han alcanzado su desarrollo para ser trasplantados debido a que en esta época las temperaturas son más frías y al menos se requiere entre 20 a 25 días para poder alcanzar de 3 a 4 hojas o 15 cm de altura y esto al parecer va hacer que de alguna manera se presenten algunos problemas en su desarrollo y productividad, los cuales podrían mitigarse con un adecuado manejo del cultivo como es abonamiento y riego oportuno.

RECOMENDACIONES:

Teniendo en cuenta que aún hay algunos terrenos en el que el cultivo no ha sido trasplantado.

- Se recomienda aplicar antes del trasplante algún herbicida para el control pre emergente en gramíneas anuales, ciperáceas de reproducción sexual y algunas especies de hoja ancha.
- Mantener una lámina de agua de 5 a 10 cm de altura con la circulación cerrada al momento del trasplante hasta los 6 días posteriores antes de la emergencia de las malezas.
- Realizar el abonamiento oportuno con dosis adecuadas.

ANEXO

Tabla N° 01 Clasificación del Riesgo Agroclimático de las Cuencas de los ríos Chira- Piura.

RIESGO AGROCLIMÁTICO			
Categoría	Porcentaje (%)	Grado de afectación al cultivo	Rendimiento del cultivo
Muy bajo	0-19	Sin afectación	Superior a su promedio
Bajo	19-25	Ligeramente afectado	Ligeramente superior a su promedio
Moderado	26-34	Moderadamente afectado	Dentro de lo esperado
Alto	35-44	Fuertemente afectado	Inferior a su promedio
Muy alto	45-100	Totalmente afectado	Pérdida

Fuente: SENAMHI-DAM

Presidenta Ejecutiva del SENAMHI:

Ing. Amelia Díaz Pabló

Director de Agrometeorología:

Ing. Constantino Alarcón Velazco

Responsable:

Ing. Walter Sernaqué Saavedra

Ing. Karim Quevedo Caiña



**Jr. Cahuide N° 785, Jesús María
Lima 11- Perú**

Central telefónica: (51-1) 614-1413-Anexo 452

Teléfono directo: (51-1) 614-1413

Telefax: (51-1) 471-7287



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

Servicio Nacional de Meteorología
e Hidrología del Perú - SENAMHI