



PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO PAPA



Pronóstico Agrometeorológico Del 12 al 21 marzo de 2026

En la sierra norte y sierra central, se espera que las etapas de crecimiento vegetativo, floración, tuberización y maduración de los sembríos de papa continúen bajo condiciones de disponibilidad hídrica favorables. Sin embargo, debido a la alta humedad, también persistirá la incidencia de la racha, alternaria y otras enfermedades foliares; así como síntomas de amarillamiento por sobresaturación prolongada del suelo, entre otros impactos. Asimismo, no se descartan afectaciones por las granizadas, heladas, lluvias intensas, entre otros eventos extremo y dificultades para la realización oportuna de labores de campo.

En la sierra sur, las condiciones de humedad continuarían limitadas, especialmente en las zonas medias de sierra sur occidental, oriental y en gran parte del altiplano, persistiendo los síntomas de escaso desarrollo, amarillamiento de hojas, escasa tuberización, marchitez de hojas, entre otras afectaciones en las plantaciones de papa en curso. Así como daños por la granizada, helada, nevada y otros eventos extremos propios de la temporada.



Mapa 1. Lluvias pronosticadas para los próximos 10 días

Próxima Actualización 25 de marzo del 2026

Tener en cuenta


- El Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Monitoreo fenológico

1^o DÉCADA DE MARZO 2026 (01 al 10)

Al 10 de marzo, en las localidades de la sierra norte como Quilcate y La Encañada (Cajamarca), los sembríos de papa predominaron en crecimiento vegetativo y botón floral; mientras que, en las zonas productoras de la sierra central como Pachacoto y Pira (Ancash); Huaros (sierra de Lima); San Pedro de Huacarpana (sierra de Ica); Comas, Runatullo, Huancaipí y Huayao (Junín); Pilchaca y Pampas (Huancavelica) y La Quinua (Aya-cucho) se reportaron campos de papa en crecimiento vegetativo, botón floral, floración y maduración.

En la sierra sur y el altiplano los puntos de observación como Granja Kayra y Colquepata (Cusco); Chivay, Machaguay y Pampacolca (sierra de Arequipa); Carumas (sierra de Moquegua); Cairani y Candarave (sierra de Tacna); Arapa, Isla Soto, Putina, Taraco, Cuyo Cuyo, Tahuaco y Huaraya Moho (Puno) las parcelas de papa predominaron en crecimiento vegetativo, botón floral, floración y maduración.



Tener en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de papa observada al 10 de marzo 2026; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador.

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413

Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe



Ministerio
del Ambiente



Impactos del clima



En la sierra norte y sierra central, las condiciones de humedad continuaron favorables para el avance de la campaña agrícola de papa. Sin embargo, la cobertura nubosa y la humedad atmosférica favoreció la presencia de la rancha, alternaria y otras enfermedades fitosanitarias; así como daños por exceso de humedad, granizadas y otros eventos extremos propios de la temporada. Asimismo, según los reportes de las estaciones de Payhua (sierra de Lima); El Mantaro, Apata y Muqui (Junín), la humedad del suelo fluctuó entre 20% y 35% de volumen, favoreciendo el desarrollo normal de las plantas y la ejecución de labores agrícolas.

En la sierra sur occidental, las condiciones de humedad continuaron su tendencia a la baja, afectando el desarrollo normal de las plantaciones y la ejecución de labores agrícolas oportunas. Asimismo, se reportaron daños localizados por la helada y granizada; así

como sembríos de papa con síntomas de estrés hídrico, producto de escasez de humedad. En la sierra sur oriental, las plantaciones de papa continuaron su curso sin muchos cambios, ya que las condiciones de humedad permanecieron estables. Según datos de la estación USI (Cusco), la humedad del suelo durante los últimos 10 días fluctuó en torno a 30 % de volumen, nivel de humedad ideal para la mayoría de los cultivos y favorable para la absorción de nutrientes, especialmente en suelos francos.

En el altiplano, la disponibilidad hídrica incrementó ligeramente, favoreciendo de manera parcial las plantaciones de papa en plena floración, tuberización y maduración. Sin embargo, en diversas localidades altoandinas, la ocurrencia de heladas y granizadas continuaron afectando los cultivos.




Gráfico 1. Condiciones de disponibilidad hídrica de la última decada (10 días)




Gráfico 2. Anomalia de lluvias de la última decada (10 días)

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe



Ministerio
del Ambiente

