

PRONÓSTICO AGROMETEROLÓGICO

CULTIVO DE MAIZ

VOL XV
EDICIÓN XXVI




Pronóstico Agrometeorológico

Del 23 de setiembre al 02 de octubre de 2025

En la franja costera, las condiciones térmicas favorables para crecimiento vegetativo y maduración del grano de Maíz Amarillo Duro (MAD) continuarán acorde a su temporada; y se espera que dicho ambiente promueva las labores culturales, labranza, siembra, cosecha y postcosecha, especialmente en el interior de los valles y quebradas. Por otro lado, no se descartaría un incremento de necesidades de riego y la incidencia de plagas de la temporada.

En la sierra norte, se mantendrán las condiciones para el crecimiento vegetativo de las plantaciones instaladas; así como para las labores culturales, labranza y siembra en secano. Por el contrario, en las localidades de la vertiente oriental de la sierra central y sur, persistirán las necesidades de riego para las plantaciones destinadas para choclo y para la ejecución oportuna de labores culturales, debido a las lluvias escasas previstas. Sin descartar afectaciones por la granizada, helada, olas de calor y otros eventos extremos de la temporada.

En las localidades de la selva norte y selva central, un incremento de humedad favorecerán las plantaciones de MAD en curso, propiciando la ejecución oportuna de labores culturales. Sin embargo, no se descartaría que, la presencia de días cálidos incremente las necesidades hídricas, especialmente en la selva sur.



Próxima Actualización: 03 de octubre 2025

Tener en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.


Etapas de crecimiento

2º DÉCADA DE SETIEMBRE (11 AL 20)

En las localidades costeras como Talla (La Libertad), Alcantarilla, Pacaran y Camay (Lima) y La Joya (Arequipa), los sembríos de Maíz Amarillo Duro (MAD) se encuentran en siembra y crecimiento vegetativo, mayoritariamente.

En la región andina, se observó las primeras actividades de labranza y siembra en secano, tal como evidencian las estaciones de Pisac y Caycay (Cusco); Ubinas y Machaguay (Arequipa); en tanto que, las primeras siembras de maíz amiláceo para choclo se encuentran en crecimiento vegetativo, según los reportes de Tarma (Junín) y Pauza (sur de Ayacucho).

En las localidades de la región amazónica como Alao y Tabalosos (San Martín), los campos de maíz amarillo duro se encuentran en crecimiento vegetativo y maduración.



Tener en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de maíz observada al 20 de setiembre 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.


Impactos del clima en el cultivo de maíz



En la franja costera, las necesidades de riesgo para las plantaciones de Maíz Amarillo Duro (MAD) en curso, incrementaron significativamente, debido a la prevalencia de días ligeramente cálidos. Asimismo, dicho ambiente, propició la presencia del cogollero, mosca de la mazorca y otras plagas de la temporada. Sin embargo, en aquellos campos con buena disponibilidad de riego, las plantaciones continuaron su desarrollo acorde a lo esperado para la temporada.

En la sierra norte, el incremento de la disponibilidad hídrica favoreció el avance de la campaña de maíz amiláceo para choclo (campaña 2025); asimismo, se registró un ambiente propicio para la ejecución oportuna de labores culturales, y las actividades de labranza y siembra en secano (campaña 2025-2026), como consecuencia de lluvias reportadas superiores a su promedio climático. Por el contrario, en los sectores de la vertiente oriental de la sierra central y sur, la disminución de humedad ocasionó una mayor demanda de riego, y se reportaron la presencia de síntomas de marchitez temporal, especialmente en las zonas medias y bajas. Asimismo, estas condiciones de escasa humedad retrasaron las labores de labranza en secano.

En las localidades de la selva norte alta y selva central, la presencia de días cálidos aunada a la disminución de lluvias retrasó las labores culturales y las actividades de labranza y siembra; al mismo tiempo que, repercutió en el crecimiento vegetativo de las plantaciones instaladas. Asimismo, estas condiciones propiciaron la aparición de plagas.



Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf.: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico de maíz al 20 de setiembre 2025

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
CO-Talla	La Libertad	7°16'48.33"	79°25'8.61"	117	Maíz	Dekal-7508	26-06-25	Aparición de hojas	07-07-25	Bueno
MAP-Alcantarilla	Lima	11°3'38.45"	77°33'0.38"	131	Maíz	NK 252	28-07-25	Aparición de hojas	10-08-25	Bueno
MAP-Alcantarilla	Lima	11°3'38.45"	77°33'0.38"	131	Maíz	Dekalb 7508	23-08-25	Aparición de hojas	09-09-25	Bueno
CO-Camay	Lima	-10°54'46.58"	-77°38'56.03"	59	Maíz	De la zona	21-06-25	Aparición de hojas	29-06-25	Bueno
CO-Pacaran	Lima	12°52'0.81"	76°3'28.54"	684	Maíz	Morado	22-08-25	Aparición de hojas	03-09-25	Bueno
CO-Pauza	Ayacucho	15°16'31.17"	73°20'28.08"	2489	Maiz	Amilaceo Blanco	05-06-25	Panoja	12-09-25	Bueno
MAP-La Joya	Arequipa	16°35'0.91"	71°55'28.69"	1278	Maíz	Amilaceo Blanco	14-07-25	Aparición de hojas	26-07-25	Bueno
CO-Cabanaconde	Arequipa	15°37'21.34"	71°58'26.71"	3333	Maíz	Cabanita Blanco	15-08-25	Aparición de hojas	06-09-25	Bueno
CO-Huasacache	Arequipa	16°27'27.87"	71°33'58.85"	2200	Maíz	Canta	12-09-25	Aparición de hojas	22-09-25	Bueno
CO-Machaguay	Arequipa	15°38'43"	72°30'8"	3093	Maíz	Morado	09-09-25	Siembra		
CO-Ubinas	Moquegua	16°22'19.4"	70°51'14.2"	3381	Maíz	Blanco de la zona	18-09-25	Siembra		
CO-Caycay	Cusco	13°36'1"	71°42'1"	3117	Maíz	Blanco gigante	09-09-25	Siembra		
CO-Pisac	Cusco	13°24'58"	71°50'59"	2990	Maíz	Blanco gigante	09-09-25	Siembra		
CO-Isla Suana	Puno	16°19'48.8"	68°51'3.4"	3840	Maíz	Blanco	18-09-25	Siembra		
CO-Alao	San Martín	6°31'8"	76°43'48"	421	Maíz	Atlas 777	03-04-25	Maduración Córnea	11-07-25	Bueno
CO-Tabalosos	San Martín	6°24'59"	76°36'45"	486	Maíz	Marginal 28	08-08-25	Aparición de hojas	18-08-25	Bueno