

PRONÓSTICO AGROMETEROLÓGICO

CULTIVO DE MAÍZ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 12 al 21 marzo de 2026

En la franja costera, las plantaciones de Maíz Amarillo Duro (MAD) mantendrán su tasa de crecimiento, debido a la temporada. Sin embargo, el brillo solar y la escasa humedad ambiental, incrementarán sus necesidades de riego; asimismo, se mantendrá la alta incidencia de *gusano cogollero*, *gusano picador*, entre otras plagas y no se descartan afectaciones por exceso de humedad, especialmente en la costa norte.

En la sierra norte y central, se espera que el periodo de floración, llenado y maduración del grano continúe favorablemente. Sin embargo, la alta humedad, también propiciará la incidencia de enfermedades foliares, especialmente en los predios con escaso manejo agronómico. Y no se descartan daños por la granizada, lluvias intensas, vientos fuertes y otros eventos extremos. En algunos sectores de la sierra sur, la humedad continuaría con limitaciones, lo que repercutirá en la floración y llenado del grano, especialmente en los sembríos bajo seco.

En los sectores de la selva alta, la campaña de Maíz Amarillo Duro (MAD) continuará favorecido por las lluvias previstas; en tanto que, en la llanura amazónica norte, es probable que una disminución de humedad repercuta en el desarrollo normal de los maizales.



Próxima Actualización: 25 de marzo 2026

Tener en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.


Etapas de crecimiento

1º DÉCADA DE MARZO 2026 (01 AL 10)

En las localidades costeras como Alcantarilla (Lima), los sembríos de maíz amarillo duro (MAD) predominaron en las fases fenológicas de floración y llenado del grano.

En las localidades de la sierra norte como Ayabaca y Santo Domingo (Piura); Incahuasi (sierra Lambayeque); Callancas (La Libertad); Chota, La Encañada, A. Weberbauer, Celendín, Contumazá, Ilapa, San Miguel, San Pablo y Namora (Cajamarca), se reportaron parcelas de maíz amiláceo, mayoritariamente en crecimiento vegetativo, floración, llenado y maduración del grano. En tanto que, en las zonas productoras de la sierra central como Dos de Mayo (Huánuco); Jauja, Tarma, Viques y Huasahuasi (Junín); Salcabamba, Acobamba y Colcabamba (Huancavelica); Huancapi y San Pedro de Cachi (norte de Ayacucho) se observó predios de maíz amiláceo en plena floración y llenado del grano. En la sierra sur oriental, los puntos de observación de Andahuaylas (Apurímac); Caycay, Anta, Paruro, Pisac, Sicuani y Urubamba (Cusco) reportaron sembríos de maíz en panoja, llenado y maduración del grano; en tanto que, en las localidades de la sierra sur occidental como Chilcayoc, Lampa y Paucaray (Sur de Ayacucho); Cabanaconde, Huasacache y Machaguay (sierra de Arequipa); Ubinas y Carumas (sierra de Moquegua) y Tarata (sierra de Tacna), se observó campos de maíz en espiga, llenado y maduración del grano, mayoritariamente.

En las localidades de la región amazónica como El Porvenir, Alao, La Unión (San Martín), el maíz amarillo duro se encuentra en maduración del grano y cosecha.



Tener en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de maíz observada al 10 de marzo 2026; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente




Impactos del clima en el cultivo de maíz



En la franja costera, la persistencia de temperaturas ligeramente cálidas favoreció el crecimiento vegetativo y la maduración del maíz amarillo duro (MAD), especialmente en la costa central y sur. Sin embargo, dichas condiciones también incrementaron las necesidades hídricas; además de propiciar una mayor presión de plagas, especialmente para los campos en pleno desarrollo vegetativo.

En la sierra norte y central el periodo de crecimiento vegetativo, floración y llenado del grano, fueron favorecidos por las condiciones de disponibilidad hídrica; mientras que, en las localidades de la sierra sur, especialmente para los campos bajo secano, la escasa humedad limitó el avance normal de la presente campaña agrícola.

En la región amazónica, en los sectores de la selva alta central y sur; así como en la llanura amazónica norte, las lluvias fueron propicias para la campaña de Maíz Amarillo Duro (MAD) de la zona; sin embargo, también se incrementaron las afectaciones por problemas fitosanitarios y alta humedad.



Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf.: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe



PERÚ
Ministerio
del Ambiente



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico de maíz al 10 de marzo 2026

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
CO-Ayabaca	Piura	-4°38'15.94"	-79°42'38.77"	2648	Maíz	Blanco	20-12-25	Aparición de hojas	19-01-26	Bueno
CO-Santo Domingo	Piura	5°2'1"	79°53'1"	1475	Maíz	Blanco huancas	15-01-26	Aparición de hojas	01-02-26	Bueno
CO-Incahuasi	Lambayeque	6°14'2"	79°19'5"	3052	Maíz	Criollo	01-11-25	Espiga	15-02-26	Bueno
CO-Callancas	La Libertad	7°46'2.88"	78°28'38.19"	1501	Maíz	Amarillo	15-02-26	Aparición de hojas	22-02-26	Bueno
MAP-A. Weberbauer	Cajamarca	7°10'2.98"	78°29'35.14"	2673	Maíz	Blanco	23-10-25	Cosecha	07-03-26	
CO-Cheta	Cajamarca	6°32'49.66"	78°38'55.07"	2468	Maíz	Morochio Imperial	26-10-25	Espiga	02-03-26	Bueno
CO-Celendin	Cajamarca	6°51'10.52"	78°48'41.46"	2602	Maíz	Blanco	27-10-25	Espiga	15-02-26	Bueno
CO-Contumazá	Cajamarca	7°21'54.77"	78°49'21.82"	2542	Maíz	Amarillo Común	13-01-26	Aparición de hojas	23-01-26	Bueno
CO-Llapa	Cajamarca	6°58'41.99"	78°48'40.27"	2951	Maíz	Amarillo Común	24-10-25	Espiga	05-03-26	Bueno
CO-Namora	Cajamarca	7°12'2.17"	78°19'40.16"	2760	Maíz	Morado BHA 601	02-11-25	Espiga	13-02-26	Bueno
CO-San Miguel	Cajamarca	-6°59'48.62"	-78°51'11.09"	2666	Maíz	Blanco	11-01-26	Aparición de hojas	02-02-26	Bueno
CO-San Pablo	Cajamarca	7°7'3.89"	78°49'51"	2325	Maíz	Blanco	25-01-26	Aparición de hojas	07-02-26	Bueno
MAP-Alcantarilla	Lima	11°3'38.45"	77°33'0.38"	131	Maíz	Dekalb 7508	19-12-25	Espiga	24-02-26	Bueno
CO-Pecaran	Lima	12°52'0.81"	76°3'28.54"	684	Maíz	Morado	25-02-26	Aparición de hojas	08-03-26	Bueno
CO-Jauja	Junín	11°47'11.9"	75°29'12.8"	3604	Maíz	San Jeronimo Punta Roja	03-11-25	Espiga	19-02-26	Bueno
CO-Tarma	Junín	11°23'49"	75°41'25"	3025	Maíz	Cusco Urubamba	15-09-25	Cosecha	09-03-26	
CO-Viques	Junín	12°9'47"	75°14'7"	3186	Maíz	Blanco Cusqueado	09-10-25	Maduración Lechosa	13-02-26	Bueno
CO-Huasahuasi	Junín	11°15'42"	75°37'15"	2747	Maíz	San Jeronimo Punta Roja	08-01-26	Aparición de hojas	21-01-26	Bueno
CO-Dos de Mayo	Huánuco	9°43'1"	76°46'25"	3414	Maíz	Chaucha	08-10-25	Espiga	13-02-26	Bueno
MAP-Acobamba	Huancavelica	12°51'11"	74°33'37"	3398	Maíz	Amarillo	27-10-25	Maduración Lechosa	28-02-26	Bueno
CO-Colcabamba	Huancavelica	12°24'53"	74°40'0.5"	3019	Maíz	Astilla	08-10-25	Maduración Lechosa	25-02-26	Bueno
CO-Salcabamba	Huancavelica	12°11'58"	74°47'9"	3005	Maíz	Blanco	30-10-25	Maduración Lechosa	01-03-26	Bueno
CO-Chilcayoc	Ayacucho	13°52'57.26"	73°43'35.7"	3395	Maíz	Blanco	02-10-25	Maduración Lechosa	19-02-26	Bueno
PLU-Lampa	Ayacucho	-15°11'4.85"	-73°20'52.31"	2797	Maíz	Amilaceo Blanco	09-10-25	Maduración Lechosa	05-03-26	Bueno
CO-Paucaray	Ayacucho	14°2'37.62"	73°38'19.73"	3232	Maíz	Blanco	25-10-25	Maduración Lechosa	06-03-26	Bueno
CO-Huancapi	Ayacucho	13°45'1"	74°4'14"	3117	Maíz	Amilaceo Blanco	25-10-25	Espiga	06-02-26	Bueno
CO-San Pedro de Cachi	Ayacucho	13°5'14.72"	74°23'26.4"	3247	Maíz	Ocho Rayas	10-11-26	Aparición de hojas	26-01-26	Bueno
CO-Cabanaconde	Arequipa	15°37'21.34"	71°58'26.71"	3333	Maíz	Cabanita Blanco	15-08-25	Maduración Pastosa	23-02-26	Bueno
CO-Huasacache	Arequipa	16°27'27.87"	71°33'58.85"	2200	Maíz	Canta	12-09-25	Maduración Córnea	09-03-26	Bueno
CO-Machaguay	Arequipa	15°38'43"	72°30'8"	3093	Maíz	Morado	09-09-25	Espiga	09-01-26	Bueno
CO-Ubinas	Moquegua	16°22'19.4"	70°51'14.2"	3381	Maíz	Blanco de la zona	18-09-25	Maduración Lechosa	21-02-26	Bueno
CO-Carumas	Moquegua	16°48'47"	70°41'40"	3055	Maíz	Blanco Amilaceo	12-10-25	Espiga	06-02-26	Bueno
CO-Candarave	Tacna	17°16'16"	70°15'14"	3415	Maíz	Amilaceo Blanco	18-10-25	Penoja	13-02-26	Bueno
CO-Tarata	Tacna	17°28'27"	70°2'2"	3100	Maíz	Pintado Amilaceo	24-09-25	Maduración Lechosa	20-02-26	Bueno
CO-Andahuaylas	Apurímac	13°38'55"	73°22'0"	2865	Maíz	Blanco	08-10-25	Maduración Pastosa	13-02-26	Bueno
CO-Curahasi	Apurímac	13°33'8"	72°44'5"	2741	Maíz	Blanco	26-01-26	Aparición de hojas		Bueno
CO-Cayca	Cusco	13°36'1"	71°42'1"	3117	Maíz	Blanco gigante	09-09-25	Maduración Lechosa	30-01-26	Regular
CO-Anta Ancachuro	Cusco	13°28'6"	72°12'57"	3324	Maíz	Blanco	08-10-25	Maduración Lechosa	09-03-26	Bueno
CO-Peruro	Cusco	13°46'1.13"	71°50'40.92"	3070	Maíz	Blanco	25-10-25	Espiga	31-01-26	Bueno
CO-Pisac	Cusco	13°24'58"	71°50'59"	2990	Maíz	Blanco gigante	09-09-25	Maduración Córnea	09-02-26	Bueno
CO-Sicuani	Cusco	14°15'13"	71°14'14"	3534	Maíz	Cheche	14-10-25	Maduración Lechosa	03-02-26	Bueno
CO-Urubamba	Cusco	13°18'18.6"	72°7'28.4"	2850	Maíz	Blanco Urubamba	12-09-25	Espiga		Bueno
CO-Isla Suana	Puno	16°19'48.8"	68°51'3.4"	3840	Maíz	Blanco	18-09-25	Maduración Pastosa	21-02-26	Bueno
CO-Ichúña	Puno	16°19'48.8"	68°51'3.4"	3840	Maíz	Multicolor	18-09-25	Maduración Pastosa	05-03-26	Bueno
MAP- El Porvenir	San Martín	6°35'1"	76°19'1"	223	Maíz	Marginal 28	06-09-25	Cosecha	24-02-26	
CO-Alao	San Martín	6°31'8"	76°43'48"	421	Maíz	Atlas 777	04-10-25	Maduración Córnea	05-12-25	Bueno
CO-La Unión	San Martín	7°10'20"	76°29'14"	262	Maíz	Atlas 777	15-02-26	Aparición de hojas	27-02-26	Bueno
CO-Tingo de Ponazo	San Martín	6°56'1"	76°15'1"	238	Maíz	Atlas 777	14-02-26	Aparición de hojas	25-02-26	Bueno