

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE CAFÉ




Pronóstico Agrometeorológico

Del 12 al 21 de mayo de 2023

Durante la segunda década de mayo se prevén condiciones favorables para la etapa de maduración del cultivo.

En la selva norte, en la localidad de Chontalí (Cajamarca) se registrarían lluvias entre 10 y 25 mm/dec; en las localidades de Chirinos (Cajamarca) y El Palto (Amazonas) se registrarían lluvias entre 25 y 50 mm/dec; en la localidad de Soritor se registrarían lluvias entre 50 y 75 mm/dec, en tanto que, en las localidades de Naranjillo y Pacayzapa (San Martín) se registrarían lluvias entre 75 y 100 mm/dec; estas condiciones previstas serían favorables para la etapa de fructificación y maduración.

En la selva central y sur; en las localidades de Oxapampa (Pasco) y Quebrada (Cusco) se registrarían lluvias entre 25 y 50 mm/dec, mientras que en las localidades de La Divisoria (Huánuco) y Pichanaki (Junín) se registrarían lluvias entre 50 y 75 mm/dec; en la localidad de Tambopata (Puno) no se registrarían lluvias durante la segunda década de mayo. Estas condiciones no tendrían mayor impacto en el cultivo de café debido a que estarían dentro de los valores normales para la época.



Próxima Actualización 24 de mayo de 2023

Tomar en cuenta

- * Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Monitoreo fenológico


1º DÉCADA DE MAYO DE 2023 (01 al 10)

Durante la primera década de mayo las condiciones ambientales favorecieron el desarrollo fenológico del cultivo de café.

En la selva norte, en las localidades de Chirinos y Chontalí (Cajamarca), El Palto (Amazonas) y Soritor (San Martín) continuó la etapa de fructificación; en tanto que, en las localidades de Naranjillo y Pacayzapa (San Martín) continuó la etapa de maduración y cosecha, respectivamente; el estado del cultivo fue bueno en estas localidades.

En la selva central y sur, se observó la etapa de fructificación en la localidad de Quebrada Yanatile (Cusco); en tanto que, en las localidades de Oxapampa (Pasco) y Pichanaki (Junín) y Tambopata (Puno) se observó la etapa de maduración; las labores de cosecha y beneficio del café continuaron con normalidad en estas localidades.

En todas las localidades de observación fenológica el estado del cultivo fue bueno y las condiciones meteorológicas fueron favorables para la etapa de maduración del cultivo.



Tomar en cuenta

- * La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- * El mapa contiene información de la última fase del cultivo de café observada al 10 de mayo de 2023; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador.

Impactos del clima




Las condiciones meteorológicas fueron favorables para el cultivo de café durante la primera década de mayo; en la selva norte se registraron temperaturas máxima y mínima promedios de 30°C y 19,4°C, respectivamente; las condiciones térmicas diurnas y nocturnas fueron superiores a la media. El incremento de la temperatura tuvo impacto positivo en las etapas de fructificación y maduración. Los acumulados de lluvia fueron superiores a lo esperado (60,2%); el índice de humedad fue superior durante la primera década de mayo.

En la selva central, se presentaron condiciones térmicas diurnas y nocturnas superiores a lo normal, se registraron valores de temperatura

máxima y mínima promedios de 31,7°C y 22,3°C, respectivamente. Estas condiciones fueron favorables para las etapas de fructificación en las localidades de Oxapampa (Pasco) y Quebrada Yanatile (Cusco); y para la etapa de maduración en las localidades de Pichanaki (Junín) y Tambopata (Puno).

En el Gráfico 1, se observan los valores de temperatura máxima, mínima y media, y la precipitación, en la localidad de Chontalí (Cajamarca), durante la campaña agrícola 2022-2023. La temperatura media osciló entre 26°C y 14,4°C; la ligera disminución de la temperatura no habría tenido mayor impacto en la etapa de fructificación en la localidad Chontalí (Cajamarca).



Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica

Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413

Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Anexo: Estaciones de monitoreo

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico				
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Fecha Hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
CO-Chirinos	Cajamarca	5°18'30.59"	78°53'51.32"	1772	Café	23-10-20	Fructificación	31-10-22	Bueno
CO-Chontalí	Cajamarca	5°38'38"	79°5'24"	1627	Café	31-08-22	Fructificación	12-10-22	Bueno
CO-El Palto	Amazonas	6°0'1.4"	78°28'15.5"	1467	Café	01-09-21	Fructificación	11-11-22	Bueno
CO-Naranjillo	San Martín	5°49'34"	77°23'14"	890	Café	12-08-21	Maduración	23-01-23	Bueno
CO-Pacayzapa	San Martín	6°15'22"	76°46'41"	924	Café	07-05-22	Maduración	22-12-22	Bueno
CO-Soritor	San Martín	6°8'43"	77°5'41"	890	Café	01-06-20	Fructificación	15-08-22	Bueno
CO-Oxapampa	Pasco	10°33'51.12"	75°25'6.24"	1801	Café	03-07-05	Maduración	12-03-23	Bueno
CO-Pichanaki	Junín	10°57'56.016"	74°49'57"	546	Café	01-09-19	Maduración	21-12-22	Bueno
CO-Quebrada	Cusco	12°41'1"	72°17'1"	1050	Café	22-05-20	Fructificación	08-11-22	Bueno
CO-Tambopata	Puno	15°13'0"	69°09'25"	1385	Café	01-10-22	Maduración	17-02-23	Bueno

