

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE CACAO




Pronóstico Agrometeorológico

Del 24 marzo al 02 de abril de 2026

Se prevén lluvias significativas en toda la región amazónica durante los próximos diez días. Mientras que la selva norte y sur esperan acumulados de hasta 150 mm (con tormentas y ráfagas de viento hacia el sur), la selva centro registrará los valores más altos del país, alcanzando o superando los 250 mm en la selva alta debido a una fuerte humedad y actividad convectiva.

Las precipitaciones previstas favorecerían la turgencia necesaria para el llenado y expansión de las mazorcas en fructificación, optimizando su peso final. Durante la maduración, la humedad y las temperaturas moderadas facilitan la síntesis de azúcares y el desarrollo del mucílago; sin embargo, debido a los acumulados previstos de hasta 250 mm, es imperativo asegurar un drenaje eficiente para evitar la asfixia radicular. Asimismo, dado que el paso de un ambiente seco a uno de alta humedad y calor propicia la propagación de monilia, pudrición parda, entre otras.

Se recomienda mantener un monitoreo constante ante el posible incremento de plagas y enfermedades. Paralelamente, realizar un control oportuno de malezas, efectuar el drenaje de aguas estancadas y realizar las cosechas en zonas cercanas a los cauces, y mantenerse atento a los avisos meteorológicos oficiales para anticipar medidas de manejo.



Próxima Actualización 07 de abril del 2026

Tomar en cuenta

- Pronóstico agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Monitoreo fenológico


2° DÉCADA DE MARZO 2026 (11 AL 20)

SELVA NORTE

En San Martín, las plantaciones de cacao CCN-51 continuaron en fase de maduración en las zonas de monitoreo de Campanilla, Pachiza, Huayabamba y Pilluana en su gran mayoría, el estado fenológico es bueno. Asimismo, en Pucallpa, la variedad ICS-95 continuó en la fase de fructificación con estado bueno.

SELVA CENTRO

En la zona de monitoreo de Aucayacu (Huánuco), las plantaciones de cacao variedad CCN51 se encontraron en maduración presentando buen estado. Por otro lado, en Pichanaki (Junín), los cultivos de la misma variedad continuaron en la etapa de fructificación con estado bueno.



Tomar en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI; así como información que se presenta es un pronóstico fenológico en base a los datos históricos de la Dirección de Agrometeorología.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de cacao al 20 marzo del 2026; asimismo, muestra la evaluación del estado del cultivo reportada por el observador.

Impactos del clima

Para la **selva norte alta** la temperatura promedio máxima y mínima fue de 28.2°C y 19.1°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna y nocturna varía de normal a ligeramente cálida. La precipitación promedio del sector fue de 56.2 mm/10 días, “normal”. Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO LIGERO** (Gráfico 2). Por otro lado, para la temperatura promedio máxima y mínima fue de 32.3°C y 22.1°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna y nocturna fue habitual a su climatología. La precipitación registró un acumulado de 63.3 mm/10 días, “debajo de lo normal”. Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO LIGERO** (Gráfico 2). Para la **selva centro** la temperatura promedio máxima y mínima fue de 27.4°C y 18.7°C respectivamente, además, la anomalía térmica diurna y nocturna varía entre normal a ligeramente cálida. La precipitación promedio del sector fue de 105.1 mm/10 días, sobre lo normal. Asimismo, el índice de humedad fue de **EXCESO EXTREMO** (Gráfico 2).

En las zonas del Huallaga Central y Bajo Huallaga, así como en la selva central (Leoncio Prado y alrededores), el cultivo se encuentra mayoritariamente en fase de maduración y fructificación, favorecido por lluvias que cubren sus necesidades hídricas y benefician el llenado de mazorcas. Sin embargo, el exceso de humedad y, en algunos casos, un manejo agronómico deficiente, han incrementado la incidencia de moniliasis, lo que pone en riesgo la sanidad y calidad de la producción. Pese a estos desafíos fitosanitarios, las labores de cosecha continúan activas en diversas localidades.

En el Gráfico 1, se observan los valores de temperatura máxima, mínima media, y la precipitación, en la localidad de Aucayacu (Huánuco), durante la campaña agrícola 2025-2026. La temperatura máxima promedio fue 28.8 °C y la temperatura mínima promedio fue 21.4 °C y precipitación de 95.8 mm/10 días.

Gráfico 1:





Gráfico 2:



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico

Estación	Departamento	Ubicación			Monitoreo Fenológico				
		Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
Campanilla	San Martín	7° 26' 31,991"	76° 40' 12"	290	CACAO	CCN 51	Maduración	15/02/2026	Bueno
Pachiza	San Martín	7° 26' 21,276"	76° 40' 11,959"	380	CACAO	CCN 51	Maduración	10/02/2026	Bueno
Pilluana	San Martín	6° 46' 42,995"	76° 16' 50,015"	195	CACAO	CCN 51	Maduración	15/06/2025	Bueno
Huayabamba	San Martín	7° 13' 59,987"	76° 45' 0"	375	CACAO	CCN 51	Maduración	04/02/2026	Bueno
Pucallpa	San Martín	6° 27' 10,007"	75° 50' 44,016"	120	CACAO	ICS 95	Fructificación	04/12/2025	Bueno
Aucayacu	Huánuco	8° 55' 47,531"	76° 6' 42,156"	586	CACAO	CCN 51	Maduración	29/12/2025	Bueno
Pichanaki	Junín	10° 57' 56,016"	74° 49' 56,999"	546	CACAO	CCN 51	Maduración	10/03/2026	Regular
Chazuta	San Martín	6°57' 11,94"	76°13' 15"	203	CACAO	CCN 51	Fructificación	12/12/2025	Bueno