

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

SETIEMBRE - NOVIEMBRE

CULTIVO: PAPA



Fuente: andina.pe

De setiembre a noviembre 2024, se prevé las siguientes condiciones térmicas diurnas: predominarían condiciones superiores a lo normal en la región andina, mientras que, el litoral presentaría temperaturas dentro de sus normales en setiembre, de normales a inferiores a lo normal en octubre, y de normales a superiores en noviembre. Condiciones térmicas nocturnas serían inferiores en el litoral costero durante el trimestre, mientras que en la región andina, en setiembre y noviembre se prevé condiciones de normales a inferiores en sierra centro y sur, en octubre de normales a superiores en sierra centro oriental y sur; y normales a inferiores en la sierra centro occidental. Respecto a las precipitaciones, en setiembre, se prevé condiciones normales en costa norte y centro, a excepción de la costa sur que estaría por debajo de lo normal, mientras que la región andina estaría presentando condiciones de lluvia por debajo de lo normal. En octubre y noviembre, en el litoral costero y región andina predominarían las condiciones de normales a inferiores a lo normal.

COSTA CENTRAL Y SUR

De setiembre a noviembre, las condiciones térmicas continuarían propicias para el avance de la campaña chica 2024, ya que las temperaturas nocturnas inferiores a su normal favorecerán el desarrollo vegetativo y tuberización, por lo que los riesgos previstos fluctuarían entre bajo y muy bajo. Sin embargo, debido a las condiciones propias de la época (invierno-primavera), se mantendrá una mayor presión de enfermedades fitosanitarias asociadas a la alta humedad, especialmente en las zonas más cercanas al litoral de la costa central.

SIERRA NORTE

Durante los meses de setiembre y octubre, la prevalencia de lluvias previstas de normales a inferiores con respecto a su promedio climático y los días cálidos, continuaría generando una mayor demanda de riego en las plantaciones instaladas. Asimismo, dichas condiciones ambientales retrasarían la ejecución de las labores de labranza y siembra en secano, especialmente en octubre, por los que los riesgos estimados podrían alcanzar hasta un nivel medio. Asimismo, no se descartaría afectaciones por la ocurrencia de lluvias escasas, olas de calor y otros eventos extremos propios de la época, especialmente en la vertiente oriental.

En noviembre, la persistencia de estas condiciones adversas podría incrementar las afectaciones, por lo que no se descartaría daños durante las etapas de la campaña 2024/2025, especialmente en los predios conducidos en seco, manteniendo los niveles de riesgo medio.

SIERRA CENTRAL

Durante el mes de setiembre, debido a una mayor demanda de riego de las plantaciones instaladas como consecuencia de lluvias previstas inferiores a su promedio climático y días más cálidos de los habituales, se mantendrá los niveles de riesgo medio; sin embargo, no se descartaría afectaciones por olas de calor, descensos bruscos de la temperatura nocturna y otros eventos extremos de corta duración, incrementando los factores de riesgo hasta un nivel alto.

Para el mes de octubre, la normalización de lluvias previstas, especialmente en la vertiente oriental, propiciaría las labores de labranza y siembra en seco de la campaña 2024-2025; así como avance de la campaña chica, por lo que los riegos previstos disminuirían hasta un nivel bajo: sin embargo, no se descarta que, las condiciones adversas persistan en la vertiente occidental.

Para el mes de noviembre, los factores de riesgo fluctuarían entre medio y alto, especialmente para los predios manejados en seco, debido a la persistencia de lluvias por debajo de su promedio climático y temperaturas diurnas cálidas.

SIERRA SUR Y ALTIPLANO

Durante el mes de setiembre, las lluvias escasas previstas aunada la presencia de días cálidos seguida de noches con temperaturas inferiores a su normal condicionarían un nivel de riesgo alto, para campos de papa en emergencia y crecimiento (siembras anticipadas), especialmente en los valles interandinos, zonas de circunlacustre y las islas del Titicaca.

Para octubre, la normalización de lluvias favorecerá las plantaciones instaladas en las zonas mencionadas, y el inicio de siembra en seco en gran parte de la región, por lo que los riesgos estimados serían bajos. Sin embargo, para noviembre volvería a incrementarse el riesgo a nivel alto, debido a las lluvias y temperaturas nocturnas inferiores a su climatología, pero con altas temperaturas diurnas; que provocarían condiciones de estrés hídrico, tanto para campos con cultivo en pleno crecimiento, así como, para las siembras que se realicen durante citado mes. Durante este trimestre no se descarta la ocurrencia de granizadas y heladas de forma localizada; asimismo, debido a las persistencias de días más cálidos, favorecerían al desarrollo de poblaciones de plagas.

**PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ**





PERÚ

Ministerio
del Ambiente




BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Octubre 2024