

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

NOVIEMBRE - ENERO

CULTIVO: PAPA



Fuente: andina.pe

En la costa y sierra durante los meses de noviembre – diciembre 2024 y enero 2025 se esperan precipitaciones en escenarios normales y normal inferior; sin embargo para el mes de enero se esperan escenarios entre superior, normal-superior y normal. Las condiciones térmicas diurnas serían normales y normales inferiores para la costa y para la sierra se estiman escenarios superiores a lo normal; y las condiciones térmicas nocturnas serían entre normal y normal inferior para noviembre, sin embargo, se observa escenarios superiores para ciertas regiones de la sierra durante diciembre y enero.

COSTA CENTRAL Y SUR

De noviembre a diciembre, las condiciones térmicas previstas propias de las estaciones de primavera y verano, favorecerán la finalización de la campaña chica 2024; al mismo tiempo que, se esperaría un incremento de la incidencia de problemas fitosanitarios de la temporada y una bajo desempeño agronómico, especialmente para las siembras tardías, por lo que el riesgo previsto podría alcanzar hasta un nivel alto.

Para las zonas de irrigación de la costa sur como Pampa de Majes, Santa Rita de Sigüas y La Joya (Arequipa), ubicadas en torno a 1400 m s. n. m., la prevalencia de días cálidos mantendrá una mayor demanda hídrica, incrementando la frecuencia de riego.

SIERRA NORTE

Durante el mes de noviembre, en la vertiente oriental las lluvias previstas en torno a sus normales, favorecerían el inicio de las actividades de siembra y primeros estadios del cultivo; sin embargo, en la vertiente occidental debido a la persistencia de días cálidos y precipitaciones bajo sus normales, no se descartaría retraso en las actividades de siembra. Por lo que el riesgo agroclimático mostraría niveles entre medio y alto para las vertientes oriental y occidental, respectivamente.

Por otro lado, los cultivos en curso (campaña chica) desarrollarían sus diferentes fases fenológicas bajo condiciones de alta demanda hídrica, por lo que no se descarta la aparición de síntomas como un escaso desarrollo vegetativo, marchitez temporal, entre otros impactos, producto del estrés hídrico; así como la aparición de plagas asociadas.

Entre diciembre y enero, las lluvias previstas favorecerán la últimas siembras y el avance de la campaña 2024-2025, especialmente en la vertiente oriental, por lo que los riesgos estimados fluctuarían entre medio y bajo. Por el contrario, en los sectores de la vertiente occidental, la persistencia de lluvias de normales a inferiores aunada a la prevalencia de temperaturas del aire cálidas, repercutirá de manera significativa en el desarrollo normal de la presente campaña, especialmente en los predios conducidos bajo seco, alcanzando en algunos casos niveles de riego alto.

SIERRA CENTRAL

Durante el mes de noviembre, la prevalencia de lluvias de normales a inferiores a su promedio esperado y las temperaturas del aire cálidas, mantendrán los niveles de riesgo de entre medio y bajo; sin descartar afectaciones por la ocurrencia de granizada, helada, entre otros eventos extremos de corta duración, propios de la temporada, en estos casos los niveles de riesgo podrían alcanzar hasta un nivel alto. Asimismo, no se descarta un incremento de las necesidades de riego para las plantaciones en curso.

Entre diciembre y enero, los factores de riego disminuirían, prevaleciendo en el rango bajo, como consecuencia de lluvias de normales a superiores; sin descartar afectaciones por los eventos extremos propios de la temporada.

SIERRA SUR Y ALTIPLANO

Durante el mes noviembre, la prevalencia de lluvias de normales a inferiores con respecto a su promedio climático y la presencia de días cálidos y noches más frías de habitual, mantendría un ambiente desfavorable para la ejecución adecuada de las labores de siembra en seco y emergencia de plántulas, retrasando el avance de la campaña agrícola 2024/2025, por lo que los riesgos previstos podrían fluctuar entre medio y alto, especialmente en los sectores del altiplano. Para las localidades de menor altitud de la sierra sur occidental, la prevalencia de alta radiación mantendrá una mayor demanda hídrica, estimándose un riego medio, sin descartar afectaciones por la helada, granizada, olas de calor y otros eventos extremos, propios de la época en la sierra sur.

Sin embargo, entre diciembre y enero las condiciones de disponibilidad hídrica se normalizarían, debido a las lluvias previstas de normales a superiores con respecto a su promedio climático, por lo que se esperaría la recuperación de las plantaciones establecidas y la ejecución de las últimas siembras, estimándose niveles de riesgo entre bajo y medio. Por otro lado, debido a una probable persistencia de temperaturas cálidas, no se descartaría la aparición de la “polilla de papa”, “gorgojo de los andes”, entre otras plagas que podría impactar la producción final de la presente campaña.

**PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUI**





PERÚ

Ministerio
del Ambiente




BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Diciembre 2024