

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

MARZO - MAYO

CULTIVO: PAPA



Fuente: andina.pe

Durante marzo, abril y mayo 2026, respecto a la precipitación en la costa se esperan condiciones normales a normales superiores, en la sierra se esperan condiciones entre normales a superiores. Respecto a las temperaturas máximas y mínimas en la costa se esperan condiciones entre normales y superiores.

COSTA CENTRAL Y SUR

Entre marzo y abril, la prevalencia de temperaturas del aire cálidas y la presencia de lluvias, repercutirán en las decisiones de siembra de la campaña chica 2026, debido al mayor riesgo de incidencia de plagas y enfermedades, asociadas a dichas condiciones previstas, por lo que los niveles de riesgo fluctuarán entre medio y bajo. En cuanto a las zonas de irrigación de la costa sur como Majes y La Joya (Arequipa); no se descartaría que las lluvias previstas superiores a su promedio climático y las temperaturas cálidas también aumenten los riesgos fitosanitarios; así como afectaciones a la tasa tuberización de las plantas.

SIERRA NORTE

Entre marzo y abril, el ambiente continuaría favorable para el avance de la presente campaña agrícola. Sin embargo, la persistencia de alta humedad y temperaturas más cálidas de lo habitual mantendrían mayor incidencia de enfermedades fitosanitarias, dificultades para la realización normal de labores de campo y afectaciones en las áreas agrícolas y cultivos principalmente de zonas planas, por lo que el nivel de riesgo agroclimático fluctuaría en nivel medio, especialmente en la vertiente oriental. Asimismo, no se descarta daños puntuales por granizadas, lluvias intensas, inundaciones por desborde, entre otros eventos extremos de la temporada.

Para mayo, la normalización de lluvias y la prevalencia de temperaturas cálidas, favorecerían la maduración y cosecha, por lo que predominaría riesgo agroclimático de medio a bajo. Sin embargo, para las siembras tardías conducidas bajo secano, es probable que estas condiciones ambientales propias de la temporada, incrementen los factores de riesgo.

SIERRA CENTRAL

Entre marzo y mayo, las etapas de tuberización y la maduración de las plantaciones en curso tendrán lugar acorde a lo esperado para la temporada, favorecido por las lluvias previstas entre normales y ligeramente superiores a su valor habitual, especialmente en los predios conducidos bajo secano; por lo que los riesgos estimados fluctuarán entre bajo y medio.


Sin embargo, debido a la temporada, se mantendrán las afectaciones por la rancharia, alternaria, polilla de papa y otros problemas fitosanitarios asociadas a la humedad y días cálidos, especialmente en el sector occidental; así como dificultades para la ejecución normal de labores de campo en la vertiente oriental por el exceso de humedad y lluvias persistentes previstas para la zona. En las localidades de mayor altitud, es probable que la granizada, lluvias intensas y otros eventos extremos ocasionen daños localizados, mayormente en las plantaciones sembradas tardíamente.

SIERRA SUR Y ALTIPLANO

Durante el mes de marzo, se espera que las plantaciones de papa instaladas continúen su curso, favorecido por las lluvias previstas de normales a superiores, lo que promoverá la floración, tuberización y maduración de las plantas; por lo tanto, los riesgos estimados fluctuarían entre medio y bajo. Sin embargo, no se descartaría la presencia de polilla de papa, la rancho, alternaria entre otros problemas fitosanitarios asociados a la variabilidad térmica, especialmente en la sierra sur oriental y el altiplano; así como daños por la granizada, helada y otros eventos extremos de la época para las siembras que aún se encuentran en crecimiento vegetativo y floración. En estos casos, los riesgos previstos podrían alcanzar hasta un nivel alto.

Durante los meses de abril y mayo, la maduración final y las labores cosecha podrían tener dificultades, debido a las lluvias previstas superiores a su promedio histórico, por lo que no se descarta incremento de mermas y pérdidas por la incidencia de polilla de papa, gorgojo de los andes a nivel de tubérculo y otras plagas asociadas a las cálidas registradas en la sierra sur oriental.



[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,](#)
[SUSCRIBETE AQUÍ](#)



PERÚ

Ministerio
del Ambiente





PERÚ

Ministerio
del Ambiente



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Abril 2026



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

