

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

JULIO - SETIEMBRE

CULTIVO: MAÍZ

Fuente: Agencia CYTA

Para el período julio - setiembre 2023, se prevé las siguientes condiciones térmicas diurnas: para el periodo pronosticado predominan condiciones superiores a lo normal en litoral costero, sierra norte, sierra centro y selva norte. Por otro lado, se esperarían condiciones térmicas nocturnas de normales a superiores a su climatología en el litoral costero, sierra norte, sierra sur y selva norte para el mes de julio a setiembre; excepto por la sierra centro que estaría por debajo de lo normal. Respecto a las precipitaciones, en julio y agosto se prevé de normales a inferiores en la costa, sierra norte, sierra central y selva norte. Para setiembre, las condiciones serían superiores en el litoral costero, sierra centro, sierra sur y selva norte, excepto por la sierra norte con condiciones por debajo de lo normal.

COSTA NORTE, CENTRAL Y SUR

En la costa norte, en un escenario de El Niño Costero, el cual continuaría condicionando un nivel de riesgo agroclimático entre bajo y medio, durante los meses de julio, agosto y setiembre, donde las condiciones térmicas superiores a sus normales propiciarían la presencia de plagas durante el crecimiento vegetativo del maíz. En la costa central y sur, se presentaría un nivel de riesgo agroclimático entre bajo a medio, donde las condiciones térmicas diurnas y nocturnas sobre sus normales serían propicias para la presencia de plagas durante las diferentes fases fenológicas del maíz amarillo duro.

[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ](#)

SIERRA NORTE

En la sierra norte, la presencia de un régimen térmico sobre su normal, y precipitaciones entre normales a inferiores con respecto a su climatología durante el periodo pronosticado, mostrarían niveles de riesgo agroclimático entre bajo a alto, por la presencia de algunas enfermedades fitopatógenas en pleno crecimiento vegetativo y fases de maduración avanzada, especialmente en localidades como Contumazá, San Pablo, San Miguel (Cajamarca), Sánchez Carrión y Otuzco (La Libertad). Por otro lado, durante los meses de julio y agosto, se estima que los campos agrícolas bajo secano se encontrarían en descanso.

SIERRA CENTRAL

En la sierra central, durante los meses de julio y setiembre se prevé un nivel riesgo agroclimático bajo, debido a que se pronostican condiciones térmicas diurnas superiores y un régimen nocturno entre normales y precipitaciones por debajo de sus normales, las cuales no tendrían impactos significativos, ya que los cultivos de maíz amiláceo entrarían en cosecha; sin embargo, en algunas parcelas la presencia de heladas incrementaría el riesgo para las siembras atrasadas del maíz amiláceo. Asimismo, en agosto, las precipitaciones por debajo de su normal podrían reducir la disponibilidad de agua para las parcelas conducidas bajo riego.

SIERRA SUR

En la sierra sur, entre los meses de julio y setiembre se presentaría un nivel de riesgo agroclimático bajo a medio, debido a que se prevé un régimen térmico sobre sus normales y precipitaciones por debajo de sus normales, las cuales estarían ocasionando algunos problemas de estrés hídrico en los cultivos de maíz amiláceo en maduración.

SELVA NORTE

En la selva norte, entre los meses de julio y agosto se presentaría un nivel de riesgo agroclimático bajo, debido a que prevé precipitaciones por debajo de sus normales y temperaturas sobre sus normales, las cuales no tendrían impactos significativos durante los periodos finales de maduración y cosecha del maíz amarillo duro.






PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024





TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Agosto 2023