AÑO: V
EDICIÓN X
OCTUBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO OCTUBRE - DICIEMBRE
CULTIVO: MAÍZ


Fuente: Agencia CyTA

Para el período octubre - diciembre 2023, se prevé las siguientes condiciones térmicas diurnas: para el periodo pronosticado predominan condiciones superiores a lo normal en litoral costero, región andina y selva, a excepción de la sierra norte que predominarían las condiciones bajo lo normal en noviembre y diciembre. Por otro lado, se esperarían condiciones térmicas nocturnas superiores a su climatología en el litoral costero, sierra norte y región selva; excepto por la sierra centro y sur que estarían dentro de lo normal en octubrE. Respecto a las precipitaciones, en octubre y noviembre se prevé de normales a superiores en la costa, sierra norte y centro; mientras en sierra sur y selva norte, de normales a inferiores, en octubre. Para diciembre, las condiciones serían superiores en la costa, sierra centro oriental y selva norte. Y de normales a inferiores en sierra centro occidental y sierra sur.

COSTA NORTE, CENTRAL Y SUR

La costa norte continúa bajo un escenario de Niño costero entre moderado a fuerte, el cual continuaría promoviendo un riesgo agroclimático medio a alto entre los meses de octubre y diciembre; debido principalmente por las condiciones térmicas superiores a sus normales que podrían incrementar el riesgo fitosanitario por la mayor presencia de plagas, especialmente durante la etapa de crecimiento vegetativo del maíz amarillo duro. En la costa central y sur, se presentaría un nivel de riesgo agrometeorológico entre medio a alto, donde las condiciones térmicas diurnas y nocturnas sobre sus normales favorecerían el incremento de plagas durante las diferentes fases fenológicas del maíz amarillo duro.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA, SUSCRIBETE AQUÍ

Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

SIERRA NORTE

En la sierra norte, la presencia de un régimen térmico sobre su normal en setiembre, elevarían el nivel de riesgo agroclimático entre medio y alto, para las siembras adelantadas, especialmente en las provincias de Cajamarca, San Marcos y San Miguel en el departamento de Cajamarca; así como en provincias de Sánchez Carrión y Otuzco en La Libertad. Durante los meses de octubre y noviembre se esperarían precipitaciones dentro y sobre de sus rangos normales, las cuales favorecerían las necesidades hídricas de los primeros estadios fenológicos del cultivo; sin embargo, se debería mantener vigilancia ante posible presencia de insectos-plagas, debido a las altas temperaturas, por lo cual el riesgo para el cultivo podría tener niveles entre medio y alto.

SIERRA CENTRAL

En la sierra central, durante el mes de octubre, se estima un riesgo agroclimático medio a alto, debido a que se prevé precipitaciones por debajo de su normal, lo que podría reducir la disponibilidad de agua para las parcelas conducidas bajo riego, especialmente para los maíces sembrados durante la campaña chica; las cuales podrían afectar las necesidades hídricas del maíz amiláceo en pleno crecimiento vegetativo. Asimismo, estas deficiencias de lluvias podrían afectar la preparación de los campos agrícolas para dar inicio a la campaña agrícola 2023-2024; este nivel de riesgo podría incrementarse por la presencia de heladas que podrían afectar al maíz amiláceo. Durante noviembre y diciembre, la presencia de lluvias favorecería la preparación de los terrenos agrícolas y la recuperación de las necesidades hídricas de las primeras fases fenológicas del maíz amiláceo.

SIERRA SUR

En la sierra sur, entre los meses de octubre y diciembre, se presentaría nivel de riesgo agroclimático entre medio y alto, debido a que se prevé un régimen térmico sobre sus normales y precipitaciones por debajo de sus normales, las cuales no tendrían impactos significativos para las parcelas en descanso; sin embargo, la deficiencia de lluvias podría condicionar un nivel de riesgo entre medio y alto debido a lluvias deficitarias que podrían afectar la preparación de los campos agrícolas para dar inicio a la campaña agrícola 2023-2024; asimismo, afectarían la disponibilidad hídrica durante las primeras fases fenológicas del maíz.

SELVA NORTE

En la selva norte, entre los meses de octubre y diciembre se prevé nivel de riesgo agroclimático bajo, debido a las precipitaciones sobre sus normales, las cuales favorecerían las siembras del maíz amarillo duro, especialmente en la provincia de El Dorado (San Martín) y cubrirían las necesidades hídricas del maíz amarillo en pleno crecimiento vegetativo. En noviembre, las precipitaciones por debajo de sus normales, podría causar estrés hídrico durante las etapas de panoja y espiga del maíz amarillo duro, afectando principalmente a las zonas de producción ubicadas en las provincias de Picota y Bellavista.


80°0'0"O
75°0'0"O
70°0'0"O
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
N
W
E
S
Octubre 2023
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
PERÚ
Ministerio del Ambiente
Senamhi
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE MAÍZ
ESCALA: 1:8000000
ELABORACIÓN:
DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLOGÍA SENAMHI
MAPA N°


80°0'0"O
75°0'0"O
70°0'0"O
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
N
W
E
S
Noviembre 2023
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
PERÚ
Ministerio del Ambiente
Senamhi
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE MAÍZ
ESCALA: 1:8000000
ELABORACIÓN:
DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLOGÍA SENAMHI
MAPA N°



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Noviembre 2023