AÑO: VI
EDICIÓN III
MARZO

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO
MARZO - MAYO
CULTIVO: MAÍZ


Fuente: Agencia CyTA

Para el período marzo 2024 – mayo 2024, se prevé las siguientes condiciones térmicas diurnas: para el periodo pronosticado predominarían condiciones superiores a lo normal en litoral costero, región andina y selva, a excepción de la costa central y sur con condiciones diurnas inferiores a lo normal en mayo. Condiciones térmicas nocturnas sobre lo normal en costa norte y centro, sierra norte y sierra centro occidental y selva norte en marzo, sobre lo normal en toda la región andina y selva, y por debajo de lo normal en costa para abril. Y por debajo lo normal a lo largo de la costa, y sierra centro occidental en mayo. Respecto a las precipitaciones, en marzo, se prevé de normales a superiores en la sierra norte y selva norte. En abril, las precipitaciones estarían inferiores sus normales en la región andina y selva. En mayo, las condiciones serían normales a superiores en la vertiente oriental de los Andes y selva norte.

COSTA NORTE, CENTRAL Y SUR

En la región de la costa norte, para marzo y abril se presentaría un nivel de riesgo agroclimático medio, debido a la prevalencia de condiciones diurnas y nocturnas superiores a sus valores normales, además de la probabilidad de precipitaciones puntuales de moderada y fuerte intensidad, que no tendrían impactos significativos para el maíz amarillo duro en pleno crecimiento vegetativo; en mayo el nivel de riesgo sería bajo por la transición hacia condiciones térmicas normales y la deficiencia estacional de precipitaciones en la costa norte. En la costa central y sur, se presentaría un nivel de riesgo agroclimático entre bajo a medio, donde las condiciones térmicas diurnas y nocturnas sobre sus normales favorecerían una mayor demanda hídrica y presencia de gusanos de hoja durante el crecimiento vegetativo del maíz amarillo duro.

SIERRA NORTE

En la sierra norte, durante marzo-mayo 2024, las temperaturas máximas y mínimas sobre sus normales y precipitaciones normales a superiores condicionarían el cultivo de maíz amiláceo a niveles de riesgo medio para campos del sector occidental y de nivel medio a alto para campos del sector oriental, durante las fases de panoja, espiga y maduración; debido principalmente a la presencia de plagas y enfermedades que afectarían la formación de granos del maíz amiláceo.

Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

SIERRA CENTRAL

En la sierra central, durante marzo-abril 2024, se estima un riesgo agroclimático entre medio a alto, en lo que va de marzo, las lluvias están siendo extraordinarias y están generando problemas fitopatógenos generalizados en campos de maíz, sobre todo en aquellos que no tiene buen drenaje. Asimismo, este nivel de riesgo aumentaría por las lluvias sobre sus valores normales para marzo. Mientras que, en mayo las precipitaciones por encima de sus normales no tendrían impactos significativos para los campos agrícolas que entrarían en descanso y en algunas parcelas agrícolas no serían favorables para las labores de cosecha.

SIERRA SUR

En la sierra sur, durante marzo y abril-2024 se presentaría un nivel de riesgo agroclimático bajo, debido a que se prevé un régimen térmico sobre sus normales y precipitaciones entre normal y por debajo de sus normales, las cuales no afectarían la disponibilidad hídrica durante la formación de granos del maíz amiláceo. Durante mayo, las lluvias sobre sus normales no serían favorables para realizar las labores de cosecha, condicionando un nivel de riesgo entre bajo a medio.

SELVA NORTE

En la selva norte, durante marzo, se estima un nivel de riesgo agroclimático entre bajo a medio, debido a un régimen térmico superiores a sus normales y precipitaciones sobre su normales que favorecerían las necesidades hídricas del cultivo de maíz amarillo duro; sin embargo, en algunas parcelas con mal drenaje podrían ocasionar inundaciones. En abril las lluvias por debajo de su normal podrían condicionar déficit hídrico en las parcelas de maíz. Durante mayo, las lluvias sobre sus normales favorecerían la formación de granos ene le maíz amarillo duro.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA, SUSCRIBETE AQUÍ


80°0'0"W
75°0'0"W
70°0'0"W
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
N
W
E
S
Marzo de 2024
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE MAÍZ
ESCALA
ELABORACIÓN
MAPA N°


80°0'0"W
75°0'0"W
70°0'0"W
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
N
W
E
S
Abril de 2024
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE MAÍZ
ESCALA
ELABORACIÓN
MAPA N°



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Abril 2024