

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

DICIEMBRE - FEBRERO

CULTIVO: MAÍZ

Fuente: Agencia CyTA

De acuerdo a los escenarios para el trimestre diciembre 2024 – enero y febrero 2025, se espera para la costa condiciones normales e inferiores para la precipitación, respecto a las condiciones térmicas diurnas se espera condiciones normales y superiores, en el caso de las nocturnas, se espera condiciones normales. En la sierra se esperan precipitaciones normales y superiores, además, condiciones térmicas diurnas y nocturnas de normales y superiores. En la selva se esperan precipitaciones normales y superiores, además, condiciones térmicas diurnas y nocturnas normales y superiores.

REGIÓN COSTERA

En la franja costera central y sur, las condiciones térmicas del aire propias de la estación, propiciarán una mayor tasa de crecimiento vegetativo, maduración del grano y la ejecución de las labores de cosecha y postcosecha; sin embargo, debido a dichas condiciones, también se incrementará la demanda de riego de los campos sobre todo para el mes de febrero en que las temperaturas máximas serían superiores a su normal, por lo que se estima un riesgo entre medio y bajo, mayoritariamente.

Sin embargo, en algunos valles costeros del norte, las condiciones para suplir dichas demandas hídricas continuarán muy limitadas, debido al volumen de las reservas en los embalses de la región y lluvias previstas inferiores a su normal en el sector occidental de la sierra norte. En estos casos, los riesgos previstos podrían alcanzar hasta un nivel alto; en ese sentido, no se descartaría una mayor incidencia de plagas, escaso desarrollo vegetativo de las plantas, marchites temporal y muerte de plántulas, retraso en la ejecución de labores culturales, entre otros impactos.

SIERRA NORTE

Entre diciembre y febrero, en la vertiente occidental, las condiciones restrictivas para el desarrollo normal de las plantaciones de maíz amiláceo y para la ejecución adecuada y oportuna de las labores culturales, persistirían, especialmente para los campos sembrados en seco, ya que se prevén lluvias de normales a inferiores a su promedio climático y la presencia de días cálidos, por lo que los riesgos previstos podrían alcanzar hasta un nivel alto. En ese sentido no se descarta una mayor incidencia de plagas como el cogollero, gusano picador, pulgón, entre otras; así como afectaciones por la ocurrencia de granizadas, olas de calor, helada y otros eventos extremos de la temporada.

Por el contrario, en la vertiente oriental, la prevalencia de lluvias de normales a superiores con respecto a su promedio y temperaturas diurnas acordes para la temporada propiciarán el desarrollo de la campaña agrícola sin muchos contratiempos. Sin descartar afectaciones por el incremento de enfermedades fitosanitarias asociadas a la alta humedad como la macha foliar, la roya, entre otras.

SIERRA CENTRAL

Entre diciembre y febrero, se mantendrán los bajos niveles de riesgo para el desarrollo de la campaña de maíz amiláceo, ya que se prevén lluvias de normales a superiores a su promedio histórico y temperaturas diurnas normales; por lo tanto, se esperaría un ambiente propicio para el desarrollo vegetativo, floración, llenado del grano y el inicio de las primeras cosechas de maíz choclo 2025. Asimismo, se esperarían un ambiente propicio para la ejecución adecuada y oportuna de las labores culturales, contribuyendo al desempeño agronómico de la campaña agrícola 2024-2025.

Sin descartar afectaciones por la ocurrencia de granizada, helada, vientos fuertes entre otros eventos extremos de corta duración, propios de la temporada. En estos casos, los niveles de riesgo podrían alcanzar hasta un nivel alto. Por otro lado, en algunos valles interandinos cálidos, no se descartaría la aparición de enfermedades asociadas a la alta humedad como la mancha foliar, la roya, mancha de asfalto, entre otras, especialmente en los campos con un manejo agronómico deficiente.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA.
SUSCRIBETE AQUÍ



SIERRA SUR

Entre diciembre y febrero, la prevalencia de temperaturas diurnas normales y lluvias previstas de normales a superiores con respecto a su promedio histórico, favorecerá el avance de la campaña agrícola en curso, estimándose factores de riesgo entre medio y bajo. Sin embargo, también se mantendrá las probabilidades de la ocurrencia de granizada, helada, vientos fuertes entre otros eventos extremos. En estos casos, los riesgos podrían alcanzar hasta un nivel alto. Así como la aparición de enfermedades fitosanitarias asociadas a la alta humedad, especialmente entre enero y febrero en los valles interandinos cálidos de la región.

REGIÓN AMAZONICA

Entre diciembre y febrero, la prevalencia de lluvias previstas de normales a superiores con respecto a su promedio y temperaturas diurnas de normales a ligeramente cálidas, favorecerá el avance de la campaña de maíz amarillo duro, riesgo entre medio y bajo; sin embargo, estas condiciones de alta humedad propios de la temporada aunadas a las temperaturas cálidas, generaran una ambiente propicio para la aparición de insectos plaga, enfermedades asociadas a la alta humedad, malezas, entre otros factores; así como afectaciones por desborde de quebradas, exceso de humedad prolongado y otras condiciones adversas. Así como dificultades para la ejecución de labores de cosecha y postcosecha.






PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Enero 2025