

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

ENERO - MARZO

CULTIVO: ARROZ



Para el período enero 2024 y marzo 2024, se prevé las siguientes condiciones térmicas diurnas y nocturnas: para el periodo pronosticado predominarían condiciones superiores a lo normal en litoral costero y selva norte. Para costa norte, costa sur y selva norte, en enero, se prevé acumulados de precipitaciones de normales a superiores. En febrero, las condiciones serían de normales a inferiores. En marzo, para costa norte y sur de normales a inferiores, mientras que para selva norte los acumulados serían superiores a lo normal.

COSTA NORTE

En la costa norte, las precipitaciones y la temperatura superiores a lo normal condicionarían el riesgo agroclimático entre medio y alto entre los meses de enero y febrero. En marzo, se prevé condiciones de precipitación normales y condiciones de temperatura superiores a lo normal, estas condiciones podrían provocar el aumento de la evapotranspiración y la demanda de riego. No se descartarían desbordes e inundaciones que podrían afectar el cultivo en la parte media y baja de los valles arroceros.

El nivel de almacenamiento de los reservorios de la costa norte se incrementaría, por lo que se espera que se abastezca de agua a los valles de Chira, Medio y Bajo Piura, Chancay-Lambayeque y Jequetepeque.

COSTA SUR

En los valles de Camaná, Ocoña y El Tambo las condiciones meteorológicas serían favorables para el cultivo, debido a que la temperatura cálida estimularía una mayor producción de macollos y rápido elongamiento del tallo. El incremento de la temperatura también tendría efecto en una mayor población de insectos y mayor presencia en estados larvales que afectarían el crecimiento de las plántulas durante el almácigo.

En los valles arroceros de Arequipa, el cultivo de arroz se desarrollaría bajo condiciones favorables, debido a que las precipitaciones serían entre inferiores y normales, la disponibilidad del recurso hídrico entre enero y marzo favorecería las etapas de emergencia, plántula y macollaje; y la temperatura cálida estimularía el crecimiento vegetativo del cultivo.


SELVA NORTE

En los departamentos de Cajamarca, Amazonas y San Martín, el nivel de riesgo agroclimático para el cultivo estaría entre muy bajo y medio, el incremento de las temperaturas diurnas y nocturnas favorecería las etapas de emergencia, plántula y macollaje en el departamento de San Martín, en las localidades de Jepelacio, Tarapoto y San Pablo, respectivamente.

El incremento de las precipitaciones entre los meses de enero y marzo sería favorable para la siembra de almácigos y el trasplante de plántulas a terreno definitivo.

En el departamento de San Martín, las condiciones meteorológicas serían favorables para la etapa de maduración y cosecha, en las localidades de Tarapoto y Cuzco-Biavo, respectivamente.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ





PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Febrero 2024



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024