

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

SETIEMBRE - NOVIEMBRE

CULTIVO: ARROZ

En relación a las condiciones térmicas diurnas, para el litoral costero, en setiembre se esperan valores dentro de lo normal, en octubre inferiores a sus normales, y en noviembre de normales a superiores. Mientras que la selva norte estaría sobre sus valores normales. Para las condiciones térmica nocturnas, en este trimestre, el litoral tendría valores debajo de lo normal y en selva norte se preve valores sobre lo normal. Para costa norte y costa sur, se prevé acumulados de precipitaciones dentro de sus normales a inferiores en el trimestre. Mientras que, en selva norte, se pronostican valores de normales a inferiores.

COSTA NORTE

El riesgo agroclimático en la costa norte, en aquellas localidades donde se realizó la siembra de la campaña chica, presentaría niveles entre medio y alto debido al registro de temperaturas nocturnas por debajo de sus valores normales que retrasarían el crecimiento vegetativo en localidades como Partidor (Piura) y Puchaca y Oytún (Lambayeque), además de predisponer la planta para infecciones en hojas y tallos. Adicionalmente a ello, en Piura se observaría déficit en el almacenamiento de agua en los sistemas de riego Poechos y San Lorenzo debido a lo cual se restringiría la frecuencia de riego pudiendo incrementarse las necesidades hídricas del cultivo en fase de floración; en tanto que en Lambayeque, en los valles de La Leche y Zaña, donde se viene desarrollando la campaña chica de arroz, las temperaturas máximas normales, además de las temperaturas mínimas inferiores a lo normal en todo el trimestre setiembre-noviembre, podrían promover un ligero retraso de las fases vegetativas del cultivo de arroz y en el departamento de la Libertad, en el valle Jequetepeque

se tiene previsto el inicio de la campaña arrocera en octubre, sin embargo, las temperaturas mínimas inferiores a lo normal podrían retrasar el crecimiento vegetativo de los almácigos a instalarse en los meses de octubre y noviembre; además, el posible escenario de lluvias inferiores a lo normal en la sierra norte occidental, podría condicionar la disponibilidad hídrica en el valle, por lo que el nivel de riesgo agroclimático sería medio.


COSTA SUR

Entre los meses de setiembre y noviembre, durante las labores de preparación de terreno y la siembra de almácigo en los valles de Ocoña, Camaná y Tambo (Arequipa) tendría condiciones favorables para su desarrollo; sin embargo, estas condiciones podrían afectar ligeramente el crecimiento de los almácigos entre los meses de octubre y noviembre debido a la probable ocurrencia de temperaturas nocturnas bajas que retrasarían las labores de transplante.

SELVA NORTE

Entre los meses de setiembre y noviembre los niveles de riesgo agroclimático estarían entre medio y alto en la selva norte debido a que la precipitación y la temperatura nocturna estaría por debajo de lo normal y podría aumentar el estrés hídrico en la planta. En el departamento de San Martín, en localidades como Picota, Rioja, Moyobamba, Tarapoto y Biavo, la disminución de la temperatura nocturna se presentaría durante los tres meses del pronóstico y podría tener impacto negativo en el desarrollo del cultivo retrasando el desarrollo vegetativo y la etapa de maduración.

[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA.](#)
[SUSCRIBETE AQUI](#)





PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Octubre 2024



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024