

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

MARZO - MAYO

CULTIVO: ARROZ

Durante marzo, abril y mayo 2026, respecto a la precipitación en la costa se esperan condiciones entre normales y superiores, en la selva se espera condiciones entre normales a superiores. Respecto a las temperaturas máximas y mínimas en la costa se esperan condiciones superiores a lo normal, en la selva se esperan condiciones entre normales superiores a superiores.

COSTA NORTE

En la costa norte, en el departamento de Piura, las condiciones serían favorables para el crecimiento vegetativo y el inicio de la fase reproductiva en el cultivo de arroz en los valles del Chira, San Lorenzo y Bajo Piura, los niveles de almacenamiento de los reservorios de Poechos 33,9% y San Lorenzo 90,6% (al 02 de marzo) en el caso de San Lorenzo el volumen almacenado obligó a abrir las compuertas del reservorio para aliviar el reservorio. Entre marzo y abril se pronostica que las precipitaciones serían superiores a lo normal incrementando el nivel de riesgo por posibles impactos físicos en el cultivo, asimismo, no se descarta que cultivos situados en zonas ribereñas sean afectados por posibles desbordes y/o inundaciones.

En los departamentos de Lambayeque y La Libertad, las temperaturas máximas y mínimas superiores a lo normal en un escenario de un evento El Niño Costero en desarrollo, según el Comunicado Oficial ENFEN N°04-2026, donde además se prevé precipitaciones superiores a lo normal con una mayor probabilidad de episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, sin descartarse eventos extremos entre marzo y abril, se configuraría un nivel de riesgo agroclimático entre alto y muy alto para el cultivo de arroz, sobre todo en los meses de marzo y abril. Esta perspectiva climática propiciaría condiciones muy favorables para el incremento de problemas fitosanitarios (plagas y enfermedades), posibles afectaciones de áreas arroceras por desbordes de ríos y/o inundaciones, además

de afectar la calidad de los granos por las lluvias frecuentes que retrasarían el secado adecuado de los granos y aumentaría el porcentaje de granos quebrados. En cuanto a los reservorios de Tinajones (Lambayeque) y Gallito Ciego (Cajamarca) registraron 100% y 97,8% de capacidad de almacenamiento al 2 de marzo, respectivamente; no se descartarían nuevos desbordes e inundaciones.

COSTA SUR

En el departamento de Arequipa, en los valles de Camaná-Majes, Ocoña y El Tambo (cosecha en abril, en maduración pastosa y córnea) el nivel de riesgo agroclimático para el cultivo de arroz estaría entre bajo y medio debido a que las precipitaciones previstas no tendrán mayor impacto en el cultivo que está en fase de maduración en los valles de Camaná-Majes y Ocoña; mientras que en el valle de El Tambo la cosecha serían entre los meses de abril y mayo debido a que la siembra fue posterior. La radiación solar, prevista sobre sus valores normales, sería favorable para el llenado de los granos durante la etapa de maduración, no obstante, esta etapa sería acelerada debido a la influencia de la temperatura elevada. El nivel de radiación ultravioleta también estaría por encima de los valores recomendados, por lo que se recomienda el uso de prendas manga larga y sombrero de ala ancha para realizar las labores agrícolas, además de protección contra la radiación solar excesiva.

[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,](#)
[SUSCRIBETE AQUÍ](#)

SELVA NORTE

En la selva norte, el riesgo agroclimático entre los meses de marzo y abril estaría entre alto y medio, no se descartarían condiciones favorables para desbordes e inundaciones de parcelas colindantes con las riberas de los ríos; mientras que entre los meses de abril y mayo, el nivel de riesgo agroclimático estaría entre bajo y medio debido a que las precipitaciones y la temperatura estarían cercanas a los valores normales para la estación. Estas condiciones serían favorables para las etapas de crecimiento vegetativo en localidades como Rioja y Jepelacio, sin embargo, también se presentaría mayor presencia de plagas como "sogata" y mayor riesgo fitosanitario que retrasarían el inicio de la fase de floración.

[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,](#)
[SUSCRIBETE AQUÍ](#)





PERÚ

Ministerio
del Ambiente



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Abril 2026



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

