AÑO: V
EDICIÓN XII
DICIEMBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO DICIEMBRE - FEBRERO
CULTIVO: CAFÉ

Fuente: ifinca

Para el período diciembre 2023 y enero 2024, se prevé que las condiciones térmicas diurnas y nocturnas estarían sobre sus normales en la selva norte y centro. Asimismo, se prevé precipitaciones de normales a superiores en diciembre y enero. Mientras que, febrero, de normales a inferiores en selva central y selva norte.

SELVA NORTE

En la Selva norte, los niveles de riesgo agroclimático estarían entre bajo y medio, para los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024 respectivamente, debido a que se prevé temperaturas y precipitaciones sobre sus normales climáticas, que favorecerían el crecimiento y llenado de frutos; sin embargo, el exceso de precipitaciones podría aumentar la incidencia de Roya Amarilla en las plantaciones de café. En el mes de febrero de 2024, el nivel de riesgo agroclimático estaría entre medio y alto, por la estacionalidad y la prevalencia de temperaturas cálidas; y lluvias con acumulados por debajo de sus normales, afectado el normal desarrollo fisiológico de planta, además de que se podría evidenciar plantas con marchitez; afectando las zonas productoras de café como Chirinos y Chontalí (Cajamarca), El Palto (Amazonas) y Naranjillo, Soritor y Pacayzapa (San Martín).

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA, SUSCRIBETE AQUÍ

SELVA CENTRAL Y SUR

En las localidades de La Divisoria (Huánuco), Oxapampa (Pasco), Pichanaki y Villa Rica (Junín), se estima un nivel de riesgo agroclimático entre medio y alto, condicionado por la prevalencia de las altas temperaturas para los próximos 3 meses; además de lluvias con acumulados entre y sobre sus normales a su climatología, estas condiciones asociadas a la prevalencia de días cálidos, generarían una mayor tasa de evapotranspiración en las plantaciones, a su vez ocasionaría alteraciones fisiológicas y bajo llenado de frutos. Sin embargo, para el mes de febrero de 2024, se podría registrar el incremento de plagas y enfermedades como la roya del café por las precipitaciones con acumulados sobre sus normales y las altas temperaturas previstas. Para la Selva sur, en localidades de Quebrada Yanatile (Cusco), prevé lluvias con acumulados entre y por debajo de sus promedios habituales, además de condiciones térmicas diurnas y nocturnas por encima sus normales, lo que podría afectar el adecuado llenado de frutos y plantas con síntomas de estrés hídrico, por lo que se estima un nivel de riesgo agroclimático entre medio a alto, condicionado por las temperaturas. Por otro lado, en la localidad de Tambopata (Puno), se estima un nivel de riesgo agroclimático bajo, debido a que las plantaciones, se encontrarían en pleno desarrollo de fructificación, favorecido por las condiciones cálidas y precipitaciones entre sus normales.

Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024


80°0'0"W
75°0'0"W
70°0'0"W
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
N
W
E
S
Riesgo agroclimático
Diciembre de 2023
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Limite provincial
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE CAFÉ
ESCALA:
1:8000000
DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLOGÍA
SENAMHI
MAPA N°
ELABORACIÓN:


80°0'0"W
75°0'0"W
70°0'0"W
0°0'0"
5°0'0"S
10°0'0"S
15°0'0"S
N
W
E
S
Riesgo agroclimático
Enero de 2024
NIVEL
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
Limite provincial
RIESGO AGROCLIMÁTICO
CULTIVO DE CAFÉ
ESCALA:
1:8000000
DIRECCIÓN DE AGROMETEOROLOGÍA
SENAMHI
MAPA N°
ELABORACIÓN:



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Enero 2024