

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

JUNIO - AGOSTO

CULTIVO: CAFÉ

Fuente: ifinca

Para el período junio a agosto 2024, se prevé que las condiciones térmicas diurnas y nocturnas estarían sobre sus normales en la selva norte y centro. Asimismo, se prevé precipitaciones de normales a superiores en selva norte baja en mayo; inferiores en selva norte y centro durante julio y agosto.

SELVA NORTE

En las zonas cafetaleras del departamento de Cajamarca (San Ignacio y Jaén), para el siguiente trimestre de junio a agosto, se prevé condiciones cálidas; además de lluvias entre normales y superiores, perspectivas que favorecerían la maduración del café, así como el avance de las cosechas, por lo que se estima un nivel de riesgo agroclimático bajo. En tanto, para las zonas productoras de Alto mayo (San Martín) las lluvias estarían dentro de sus rangos normales a inferiores; además de la continuidad de condiciones cálidas, hecho que podría generar déficit hídrico en el cultivo, afectado el normal desarrollo de la floración del café, por lo que el nivel de riesgo agroclimático fluctuaría entre medio y bajo en el siguiente trimestre.


SELVA CENTRAL

En selva central (Pichanaki), se prevé que las lluvias fluctúen entre lo normal a inferior; sumado al estrés térmico, producto de las altas temperaturas en el próximo trimestre estas condiciones afectarían la fase de fructificación, limitando el adecuado crecimiento de los granos de café; en plantaciones de mayor altitud que estén en fase de maduración, podrían generar condiciones favorables para el incremento de la broca del café, además del adelanto de las cosechas, por lo que el nivel de riesgo agroclimático fluctuaría entre medio a alto, condicionado por los valores de temperaturas sobre lo normal.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA.
SUSCRIBETE AQUÍ

SELVA SUR

Para las zonas productoras de la selva sur Quebrada-Yanatile (Cusco), continuarían bajo un régimen térmico cálido y lluvias entre normales en junio y bajo lo normal en julio y agosto para el próximo trimestre; escenario que ocasionaría déficit hídrico, observándose bayas con escaso desarrollo; y en zonas de baja altitud promovería las cosechas más tempranas. No se descarta, ambientes favorables para el desarrollo e incremento de broca del café. Por lo que se estima un nivel de riesgo entre medio a alto en el trimestre. En tanto, en la localidad de Tambopata (Puno) las lluvias entre normales en junio, favorecerían el avance de la maduración, por lo que se prevé un nivel de riesgo agroclimático bajo, ya en julio y agosto incrementaría el nivel de riesgo agroclimático a medio, debido a la reducción de las lluvias que podrían limitar el avance de la maduración.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413

Cons

TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Julio 2024



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024