

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

MARZO - MAYO

CULTIVO: CACAO



Durante marzo, abril y mayo 2026, respecto a la precipitación en la selva se esperan condiciones entre normales a superiores. Respecto a las temperaturas máximas y mínimas se esperan condiciones entre normales superiores a superiores.



SELVA NORTE

Para las zonas cacaoteras del departamento de San Martín, se estima que durante marzo el nivel de riesgo agroclimático oscile entre medio y bajo en zonas localizadas, debido a la posible presencia de condiciones más húmedas de lo habitual, asociadas a precipitaciones por encima de sus valores normales y al predominio de temperaturas mayormente cálidas. Este escenario podría favorecer la proliferación de enfermedades fungosas y plagas, lo que comprometería la calidad de las mazorcas. No obstante, estas mismas condiciones de humedad y temperatura también podrían contribuir al adecuado desarrollo de las fases de fructificación, especialmente en campos con manejo agronómico adecuado y donde las lluvias se presenten de manera moderada. Asimismo, persistiría el riesgo de desbordes en áreas ribereñas, que podrían afectar directamente los frutos ubicados en la parte basal de las plantas. Para abril y mayo, los niveles de riesgo tenderían a mantenerse bajos, debido a la previsión de precipitaciones entre normales y ligeramente superiores a lo habitual, condiciones que resultarían favorables para el crecimiento y la maduración de los frutos.

SELVA CENTRO

Las plantaciones de cacao en la selva de Huánuco y Ucayali se encuentran mayoritariamente en fructificación; según el pronóstico, se esperaría que las lluvias se mantengan sobre sus valores normales, favorable para el avance de esta fase, principalmente en parcelas con adecuado manejo. No obstante, en zonas localizadas donde las plantaciones estén ubicadas cerca de ríos, parcelas con drenaje deficiente e inadecuado manejo, los niveles de riesgo podrían alcanzar niveles medios en marzo, ya que se podrían generar ambientes favorables para el incremento de enfermedades fungosas, así como daños a nivel de raíces; además, estas condiciones podrían predisponer el incremento de plagas asociadas a ambientes cálidos, entre otros factores. Hacia abril y mayo, los niveles de riesgo agroclimático podrían fluctuar entre bajo y medio, debido a la reducción de las lluvias en comparación con marzo; no obstante, en sectores localizados aún podrían mantenerse casos de enfermedades fitosanitarias.


[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,](#)
[SUSCRIBETE AQUÍ](#)



PERÚ

Ministerio
del Ambiente





TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Abril 2026