VOL VII
EDICIÓN XXVI

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO PASTIZALES

Pronóstico Agrometeorológico

Del 23 de setiembre al 02 de octubre de 2025

Durante los próximos días, se prevén precipitaciones en la región andina, con mayor concentración entre el 24 y el 27 de setiembre, en donde se estiman acumulados de 50 a 75 mm en un periodo de 10 días en la sierra norte y la sierra centro oriental, lo cual favorecería el desarrollo de los pastos cultivados, como la alfalfa y el rye grass, ya que proporcionarán la humedad necesaria para el crecimiento vegetativo

En las zonas más altas, especialmente la sierra centro y la sierra sur, se esperarían precipitaciones sólidas (nieve o granizo) que podrían cubrir temporalmente los pastizales y limitar el acceso al forraje, afectando la alimentación del ganado. Así mismo, las temperaturas bajas y la presencia de nieve aumentarían el estrés por frio en animales con estado nutricional deficiente, especialmente en las primeras horas de la mañana. Además, la disponibilidad hídrica en la zona de pastoreo favorecería brotes de pastos naturales, principalmente en las zonas altas de la sierra centro.

Se prevé un aumento de las temperaturas diurnas en la sierra sur debido al cambio en las precipitaciones, siendo más notable en la sierra occidental, donde habrá más radiación solar y menor disponibilidad de forraje para el ganado durante el pastoreo diurno.

En la selva de San Martín (Cuñumbuque), se prevén lluvias de ligera a fuerte intensidad, con acumulados que podrían superar los 150 mm, lo cual favorecería las pasturas como la brachiaria, entre otras especies. Además, en ciertas zonas se asociaría al vigésimo segundo friaje del año.



Próxima Actualización 03 de octubre de 2025

Tomar en cuenta

- El Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los pastizales de importancia pecuaria ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Monitoreo fenológico

2° Década de Setiembre de 2025 (11 al 20)

En la sierra norte (Cajamarca), las estaciones de monitoreo ubicadas en Granja Porcón, Sondor y Chugur registraron plantas de rye grass en distintos estados de desarrollo, que van desde macollaje, elongación y floración. En cambio, en la parcela de A. Weberbauer la alfalfa continúa en plena floración. Por otro lado, en la sierra central, zona intermedia como Tarma (Junín) presentó plantas en fase de brotamiento.

En la sierra suroccidental, especialmente en la zona media de Arequipa, la alfalfa se encontraba mayoritariamente en brotación; sin embargo, en Machaguay (Arequipa) alcanzó la floración.

En las zonas altoandinas dedicadas a la crianza de camélidos, los pastos naturales se hallan en reposo vegetativo, como es habitual en la época. Excepto en la sierra central, en ciertas áreas como Huancavelica, se han observado brotes de pastos naturales.

Por otra parte, la selva de San Martín (Cuñumbuque), reportó plantas de brachiaria en fase de maduración.



Tomar en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase de los pastizales observada al 20 de setiembre 2025; asimismo, muestra la evaluación visual del estado de las plantas reportada por el observador.

Impactos del clima

En la sierra norte, particularmente en zonas como Granja Porcón y Sondor, situadas en Cajamarca, se registraron temperaturas ligeramente cálidas. En Granja Porcón se evidenciaron precipitaciones, similar situación se presentó en A. Weberbauer, aunque estas resultaron insuficientes para mantener en buen estado los pastos, como la alfalfa, que mostró una condición regular, mientras que en Sondor prevaleció un clima significativamente más seco, debido a ello, se llevaron labores de riego para favorecer el desarrollo fenológico de los cultivos.

En la sierra central, las condiciones ambientales fueron favorables en las parcelas cultivadas de alfalfa bajo riego. En la sierra sur occidental se presentó una situación similar: las condiciones térmicas fueron ligeramente cálidas, tanto diurnas como nocturnas, con una acumulación de lluvias de 0,9 mm/decadiario, que no fueron significativas, ya que en la zona se realizaron labores de riego.

En las zonas altoandinas dedicadas a la crianza de camélidos, no se registraron cambios significativos en el estado de los pastos naturales, los cuales permanecen secos, característicos de la época asociada al reposo vegetativo por las bajas temperaturas y la escasa precipitación. En la zona de mayor altitud de la sierra centro se observaron ligeros brotes vegetativos de pastos naturales.

Gráfico de anomalías de la temperatura mínima del aire en la Sierra