




Del 22 al 31 de julio de 2020

En la sierra norte, en las localidades de Granja Porcón, La Encañada, Sondor, Chugur (Cajamarca), es probable que los pastos cultivados disminuyan su tasa de crecimiento vegetativo y su producción forrajera, debido a las condiciones pluviométricas previstas.



Próxima Actualización 05 de Agosto de 2020

## Tomar en cuenta


- \* El Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los pastizales de importancia pecuaria ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- \* Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

# Monitoreo fenológico

2ª Década de julio de 2020 (11 al 20)

En el sur de altiplano, los pastizales de iru ichu, continúan en la etapa de reposo vegetativo, según los reportes fenológicos de las localidades de Mazo Cruz y Capazo (Puno), ubicadas por encima de los 4 000 m s. n. m.

En la sierra norte, en los puntos de observación fenológica de Granja Porcón, La Encañada, Sondor, Chugur (Cajamarca), los pastos cultivados de rye grass, se encuentran en las fases fenológicas de brotamiento vegetativo, macollaje, floración y espiga.



## Tomar en cuenta

- \* La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- \* El mapa contiene información de la última fase de los pastizales observada al 20 de julio 2020; asimismo, muestra la evaluación visual del estado de las plantas reportada por el observador.

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica

Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413

Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe



PERÚ  
Ministerio  
del Ambiente



EL PERÚ PRIMERO

## Impactos del clima




En las zonas altoandinas de la sierra sur, los pastizales naturales de la zona predominaron en reposo vegetativo y senescencia, principalmente en las áreas bajo secano, ya que en gran parte de la región prevalecieron temperaturas nocturnas con valores de hasta -11 °C, según los reportes térmicos de las localidades de Chuquibambilla, Crucero, Laraqueri, Macusani, Pampahuta, Santa Lucía, Santa Rosa, Mazo Cruz, Capazo (Puno); al mismo tiempo que persisten bajos niveles de humedad, debido a las lluvias escasas, propias de la temporada.


En cuanto a los pastos cultivados que se desarrollan en la sierra central y sur, en los sectores de menor altitud (<3500 msnm), las condiciones ambientales descritas, incrementaron las necesidades hídricas, afectando la producción de materia seca y la frecuencia de cosechas

En las localidades de la sierra norte como La Encañada, Granja Porcón, Sondor y Chugur (Cajamarca), las condiciones térmicas de normales a ligeramente cálidas y las lluvias acumuladas superiores a su normal histórica, generaron condiciones ambientales favorables para los pastos cultivados de la zona, los cuales se encuentran en buen estado vegetativo.

Gráfica de la Variación Decadal del Índice de la Humedad



Gráfica de la Variación Decadal de Anomalías de la Temperatura Mínima



Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica

Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413

Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente



EL PERÚ PRIMERO