VOL V
EDICIÓN VII

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO PASTIZALES

Pronóstico Agrometeorológico

Del 04 al 13 de mayo de 2023

En las localidades altoandinas de las regiones de Puno, Arequipa, Tacna, Moquegua y Junín, zonas de monitoreo fenológico de pastos naturales habría lluvias entre 0 a 10 mm/década, con temperaturas nocturnas frías lo que daría inicio al proceso de senescencia de los pastizales característico a su estación. Por otro lado, las zonas inferiores a los 3200 m s. n. m., de la sierra sur occidental habría incremento de labores de riego debido a la evapotranspiración de las parcelas de alfalfa y entre otros cultivos.

Por otra parte, la sierra norte y centro prevé precipitaciones solidas o liquidas acompañada de descargas eléctricas y ráfagas de viento, de ligera a moderada intensidad de manera localizada, los que posiblemente ocasionarían caída de plantas de los cultivos de las pasturas, en aquellas parcelas con desarrollo vegetativo.

No se descarta la ocurrencia de fenómenos meteorológicos adversos como helada, que afectarían a los pastos.



Próxima Actualización 15 de mayo de 2023

Tomar en cuenta

* El Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los pastizales de importancia pecuaria ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.

* Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influyencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Monitoreo fenológico

3° Década de abril de 2023 (21 al 30)

En las zonas altoandinos de la sierra sur y Altiplano prevalecen pastizales en periodo de macollaje y panoja; sin embargo, en la estación de Chuapalca se observó en periodo de senescencia. Por otro lado, las zonas productoras de alfalfa ubicadas en la zona media de la región Tacna, Moquegua, Arequipa y Junín, presentaron plantas en brotamiento vegetativo; en cambio, en la estación de monitoreo para alfalfa se reportó en periodo de botón floral, principalmente en Carumas (Tacna).

La sierra norte como Cajamarca reportó pastos en macollaje, espiga y maduración, especialmente en pastos cultivados como rye grass. Por otra parte, los cultivos de alfalfa se observaron en periodo de brotamiento vegetativo en la estación de Jesús; por otro lado, la estación Cuñumbuque (San Martín) ubicada en la zona nororiental reportó pasto en periodo de macollaje (pasto brachiaria).



Tomar en cuenta

* La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.

* El mapa contiene información de la última fase de los pastizales observada al 30 de abril 2023; asimismo, muestra la evaluación visual del estado de las plantas reportada por el observador.

Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe

Impactos del clima

En las zonas de la sierra sur y Altiplano, ubicadas por encima de los 3900 m s. n. m. disminuyó las precipitaciones acumuladasfrente frente a las décadas anteriores y en algunas zonas altoandinas presentaron un ambiente frio, lo que retrasó la formación fenológica del pastizal, encontrándose en regular estado vegetativo como en el caso en el Altiplano, a excepción de Tacna y Arequipa; sin embargo, en zonas altas de Junín mostró poco impacto significativo debido a la insuficiente lluvias acumuladas, por lo que se observó en periodo de panojamiento limitado. Por otra parte, en la zona media de la sierra sur occidental se incrementó labores de riego en las zonas productoras de pastos cultivados.

En la sierra norte como Cajamarca, las estaciones de monitoreo como Granja Porcón, Sondor y Chugur, mostraron cultivo de rye grass en regular estado vegetativo debido al déficit de precipitaciones, a pesar que las condiciones térmicas fueron favorables, por lo que limitó el proceso fenológico por el bajo porcentaje de humedad, principalmente la alfalfa. Similar condición se presentó en la estación de Jesús.