

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO PASTIZALES




Pronóstico Agrometeorológico

Del 15 al 24 de agosto de 2023

En la región andina prevalecería cielo despejado en gran parte de la región, pero en las tardes habría un ambiente parcialmente nublado, que podrían generar precipitaciones ligeras y aisladas, principalmente en la sierra norte de Cajamarca como San Marcos y Cajabamba y entre otras. Por lo que, se consideraría realizar riegos suplementarios para mantener el normal desarrollo de los pastos cultivados.

En las zonas altas de la sierra centro y sur habría un ambiente seco y frío, con posibles precipitaciones sólidas de manera aisladas, que pondrían en riesgo la salud y el bienestar de la población pecuaria, principalmente en zonas con escasa disponibilidad vegetativa y manejo precario.

No se excluyen heladas, nevadas y otros fenómenos meteorológicos adversos que afecten a los pastos.



Próxima Actualización 23 de agosto de 2023

Tomar en cuenta


- * El Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los pastizales de importancia pecuaria ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- * Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Monitoreo fenológico

1ª Década de agosto de 2023 (01 al 10)

En la sierra norte de Cajamarca, las estaciones fenológicas como Granja Porcón, Sondor y Chugur reportaron pastos de rye grass en las fases fenológicas de brotamiento vegetativo, con la excepción de la localidad de Chugur que ha informado que se encuentran en periodo de floración. Por otro lado, la estación de Tarma (Junín) en la sierra central informó que los pastos cultivados están en el brotamiento vegetativo.

Las zonas altoandinas de la sierra centro y sur, reportaron pastos en periodo de reposo vegetativo, característico a su temporada. Y en la zona media de la sierra sur como Chuquibamba, Machaguay (Arequipa); Ubinas (Moquegua), continúan alfalfa en las fases de brotamiento vegetativo; sin embargo, en la localidad de Pampacolca (Arequipa) se observó en botón floral.



Tomar en cuenta

- * La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- * El mapa contiene información de la última fase de los pastizales observada al 10 de agosto 2023; asimismo, muestra la evaluación visual del estado de las plantas reportada por el observador.

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica

Telf: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413

Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe



PERÚ
Ministerio
del Ambiente



Impactos del clima



La región norte de Cajamarca, presentó anomalías de precipitación con valores de -100% mayoritariamente, y las condiciones térmicas fue ligeramente cálidas, y en algunas zonas como Jesús se tuvo temperaturas nocturnas dentro de los normal. Respecto a las precipitaciones fueron insuficientes para la actividad vegetativa de los pastos cultivados, por lo que se realizó labores de riego para garantizar el normal desarrollo del pasto. Sin embargo, algunas zonas como Sondor y Jesús observaron plantas en crecimiento lento y predominaron en regular estado vegetativo.

En la selva alta de San Martín, las condiciones térmicas y lluvias ligeras no fueron adecuadas para

la recuperación de las plantas, por lo que todavía se encuentran en regular estado vegetativas.

En las zonas centro y sur de la sierra, prevaleció un clima seco y frío, el cual no tuvo un impacto significativo debido a la presencia de pastos naturales sin actividad vegetativa en las zonas altoandinas. Por otro lado, las zonas de menor altitud de la sierra sur occidental, reportaron pastos cultivados en buen estado vegetativo, excepto las localidades de Pampacolca, Machahuay, Chuquibamba (Arequipa) observaron de forma localizada afectaciones por heladas en los últimos días de la primera década de agosto; sin embargo, se reportó plantas en buen estado vegetativo.

