AÑO: V
EDICIÓN IX
SETIEMBRE

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO SETIEMBRE - NOVIEMBRE

CULTIVO: PASTOS

Fuente: Perulactea

Se prevé condiciones térmicas diurnas de normales a superiores a lo normal en las zonas de monitoreo fenológico en la región andina de setiembre a noviembre. Las condiciones térmicas nocturnas en setiembre, superiores en sierra norte y sierra centro. En octubre, de normales a superiores en la región andina. Mientras que, en noviembre, solo la región de sierra sur occidental estaría por debajo de los normales. Respecto a las precipitaciones, durante setiembre se prevé acumulados de normales a inferiores en toda la región andina. En octubre, superiores en sierra norte; entre sus normales en la sierra norte; e inferiores en la sierra sur. En noviembre, de normales a superiores en sierra norte y centro, e inferiores en la sierra sur.

SIERRA NORTE Y CENTRO

En setiembre, se esperaría que la sierra norte tenga precipitaciones dentro de lo normal; mientras que, la vertiente oriental de la sierra centro, prevé lluvias por debajo a su valor histórico, a excepción la parte occidental, que tendrían lluvias similares a su climatología; en consecuencia, prevalecería un nivel de riesgo alto. En octubre y noviembre, las estaciones de monitoreo fenológico de Cajamarca (sierra norte), registrarían volúmenes de precipitación normales a superiores a su climatología, a excepción de la sierra central, donde las precipitaciones en octubre oscilarían dentro de los rangos normales; por ello se estima un nivel de riesgo medio, debido a las condiciones climáticas desfavorables repercutirían en el rendimiento de los pastos cultivados. Por otro lado, en la sierra de Piura, se prevé precipitaciones de normales a superiores a su valor histórico, con temperaturas cálidas, que podrían beneficiar la actividad vegetativa de los pastos de la zona. Por lo tanto, el nivel de riesgo agroclimático podría alcanzar hasta nivel medio.

Además, se esperan condiciones agroclimáticas de riesgo similares en las zonas altoandinas de la sierra central, ya que las lluvias previstas serían insuficientes para el inicio de brotación. Esto alargaría el periodo de reposo vegetativo de los pastos. Sin embargo, en noviembre, podría haber una disponibilidad limitada de brotes de pastos naturales.

Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

SIERRA SUR

De setiembre a noviembre, según el pronóstico climático en las zonas altoandinas de la sierra sur, las precipitaciones por debajo de lo normal; temperaturas máximas previstas superiores a su valor normal; y las mínimas dentro de su climatología, condicionarían un nivel de riesgo medio en setiembre. En octubre, se registraría temperaturas más cálidas durante la noche, lo que podría favorecer la generación de nuevos brotes en algunas zonas húmedas (bofedales, puquiales), no obstante, limitaría la actividad vegetativa debido a la escasa acumulación de precipitaciones, que prolongaría el periodo de dormancia en algunas zonas secas, incrementándose un nivel de riesgo alto; similar nivel de riesgo se presentaría en noviembre, cuando las temperaturas mínimas descenderían por debajo de sus valores históricos, sobre todo en el vertiente occidental, excepto en el vertiente oriental de la sierra sur, pero alcanzaría a un nivel de riesgo alto.

Estas condiciones climáticas, previstas en las zonas altoandinas, podrían ocasionar la degradación de los pastos deseables por la ganadería, mientras que en algunas zonas húmedas detendría temporalmente la aparición y el crecimiento de los brotes de pastos naturales. Por tanto, el nivel de riesgo aumentaría a medida que se aproxima la temporada de lluvias, debido a un posible déficit de precipitaciones acumuladas durante el periodo previsto.

Por otro lado, en las zonas de baja altitud de las regiones de Arequipa, Tacna y Moquegua, se tendrían temperaturas máximas superiores a las normales en setiembre y octubre, y prevalecería un nivel de riesgo medio, ya que el aumento de la demanda hídrica para la alfalfa, se traduciría en riegos más frecuentes. En cambio, en noviembre, se prevé que las temperaturas mínimas serían más bajas de lo habitual, lo que podría afectar negativamente al crecimiento de la alfalfa; por lo tanto, llegaría a un nivel de riesgo alto.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA, SUSCRIBETE AQUÍ





Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Octubre 2023

Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413 Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe