

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

NOVIEMBRE - ENERO

CULTIVO: PASTOS

Fuente: Perulactea

Para el período noviembre 2023 – enero 2024, se prevé las siguientes condiciones térmicas diurnas en las zonas de monitoreo fenológico: predominan temperaturas superiores a lo normal en la región andina, a excepción de la sierra centro occidental donde predominarían las condiciones dentro de su normal climática en diciembre. Por otro lado, se esperarían condiciones térmicas nocturnas superiores a su climatología en el en la región Andina; excepto por la sierra sur, que estarían dentro de lo normal en noviembre. Respecto a las precipitaciones, para noviembre, se espera que en sierra norte predominen las condiciones sobre lo normal; sierra centro y sur occidental predominen condiciones normales; e inferiores a su normal en la sierra sur oriental. Mientras que, entre diciembre 2023 y enero 2024, la condiciones en sierra norte y sierra centro sean superiores a su normal y en sierra sur

SIERRA NORTE Y CENTRO

Durante el periodo de noviembre 2023 a enero 2024, en la zona norte, se registrarían precipitaciones superiores a lo previsto en la mayoría de las zonas de producción de pastos cultivados; en cambio, para la sierra centro se prevé lluvias dentro de lo habitual durante el mes de noviembre, estos acumulados de precipitación pueden ser beneficiosas para el crecimiento de los pastos, al proporcionar mayor disponibilidad hídrica en la zona, lo que podría incrementar la producción de forraje, a excepción en algunas parcelas que carecen de drenaje, por lo que, habría inundaciones o anegamientos. Por ello, es importante realizar o mejorar los drenajes de los campos de pastos cultivados y de pastoreo.

En cuanto a las temperaturas máximas y mínimas, serían superiores a su promedio histórico en toda la región norte y centro; sin embargo, en diciembre se prevé, temperaturas diurnas dentro de lo normal en la parte oriental de la sierra norte, mientras que, la parte occidental, se esperaría que estén por encima de sus valores normales. Por otra parte, la vertiente oriental de la sierra central, tendrían temperaturas máximas por encima de lo normal; mientras que, la parte occidental, estarían dentro sus valores normales. No obstante, las temperaturas elevadas pueden influir en la calidad de los pastos al acelerar el proceso de maduración, lo que repercutiría en pastos menos nutritivos para la población pecuaria. En consecuencia, para la sierra norte prevalecería un nivel de riesgo que oscilaría entre bajo y medio, pudiendo incrementarse hasta un nivel alto, sobre todo en enero 2024 debido al exceso de humedad en el suelo. Por el contrario, en la sierra centro es más probable que persista un nivel de riesgo medio durante todo el periodo pronosticado.



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

SIERRA SUR

En noviembre del 2023, se prevé temperaturas máximas superiores a su valor normal y las mínimas prevalecerían dentro de lo habitual, las precipitaciones en las zonas intermedias de las regiones como Arequipa, Tacna, Moquegua y en algunas zonas altoandinas de la vertiente occidental, también serían normales; sin embargo, en la zona de la cordillera del altiplano las precipitaciones serían inferiores, lo que prolongaría el periodo de dormancia de los pastos naturales, principalmente en las zonas secas, por el contrario, en zonas húmedas habría pastos verdes de muy baja vigorosidad. Posteriormente en diciembre 2023 y enero 2024 probablemente persistan las escasas precipitaciones, las temperaturas altas y vientos secos, que condicionaría la marchitez de los brotes naturales, pudiendo incluso secarse, estas condiciones podrían aumentar el riesgo agroclimático en algunas áreas, que afectaría negativamente la disponibilidad de pastos para el ganado. Por lo tanto, el nivel de riesgo agroclimático para el desarrollo de pastos naturales estaría entre medio y alto, prevaleciendo el nivel alto, sobre todo en diciembre 2023 y enero 2024.

Por otro lado, en la zona media de la sierra sur occidental, el cultivo de alfalfa puede requerir riegos más frecuentes para satisfacer la demanda hídrica, debido a las condiciones climáticas. Sin embargo, con las prácticas de riego adecuadas y oportunas, el riesgo agroclimático en las zonas productoras de pastos cultivados puede mantenerse, entre un nivel bajo en noviembre 2023 y un nivel medio en diciembre 2023 y enero 2024, durante este periodo, puede haber algunas limitaciones en el riego debido a la disminución del volumen de agua en los embalses, causadas por la escasez de precipitaciones en las regiones altoandinas.

**[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ](#)**





PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Dirección de Agrometeorología / Subdirección de Predicción Agrometeorológica Tel: 988577684 - [511] 614-1413


Consultas y Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe



PERÚ Ministerio del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Diciembre 2023