

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

JULIO - SETIEMBRE

CULTIVO: FRIJOL



Para el período julio a setiembre 2023, se prevé condiciones térmicas diurnas y nocturnas superiores a lo normal para las zonas productoras de frijol. Respecto a las precipitaciones, para los meses de julio y agosto, se esperarían acumulados entre normales a inferiores. En setiembre, las costa sur y selva norte tendrían valores superiores a lo normal, e inferiores en la sierra norte y selva central.

COSTA SUR

Se prevé condiciones térmicas predominantemente cálidas, a excepción de agosto, donde se esperarían temperaturas variables; estas condiciones ambientales previstas no generarían mayor afectación a plantaciones que se encuentren en maduración y próximas a cosecha, situación en la que se encuentran la gran mayoría de valles productores de Ocoña y Camaná (Arequipa), estimándose un nivel de riesgo agroclimático bajo.

SIERRA NORTE

Durante el periodo pronosticado, y de acuerdo al escenario actual de Alerta de El Niño Costero, se prevé la persistencia de temperaturas cálidas; en relación a las lluvias, se pronostican acumulados dentro y por debajo de su promedio histórico. Estas condiciones de deficiencia de humedad y temperaturas cálidas podrían afectar la correcta acumulación de materia verde, así como los procesos de floración del cultivo de las siembras realizadas en mayo en las zonas productoras de la sierra de La Libertad y de Cajamarca, por lo que se estiman niveles de riesgo agroclimático entre medio a alto. Asimismo, debido a la estación, no se descarta descensos bruscos de temperaturas y heladas que podrían afectar a las plantaciones ubicadas en la vertiente oriental.


SELVA NORTE



Durante el periodo pronosticado, se prevé temperaturas diurnas y nocturnas de normales a superiores a su variabilidad climática. De julio a agosto, se prevé lluvias por debajo de su promedio histórico, que aunado a que la región se encuentra en temporada seca, el desarrollo de la floración y formación de vaina del cultivo se podría ver afectada, por lo que el nivel de riesgo agroclimático sería entre bajo medio; mientras que, hacia setiembre, se prevé lluvias por encima de sus valores normales que serían favorables para la recuperación de las plantaciones en las zonas productoras del Huallaga central de San Martín.

SELVA CENTRO

En la selva central, de julio a setiembre se pronostica la continuación de temperaturas por encima de sus valores normales; en relación a las lluvias, estas se encontrarían de normales a inferiores a su variabilidad climática. La persistencia de condiciones cálidas, continuaría generando riesgo por estrés, debido a altas temperaturas que podría afectar la formación y llenado de vaina del cultivo; mientras que, las precipitaciones dentro y por debajo de su normal, podría incrementar los niveles de riesgo agroclimático, estimándose entre medio y alto en gran parte de las zonas productoras de la selva de Junín (Satipo y Chanchamayo).

[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,](#)
[SUSCRIBETE AQUÍ](#)





TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Agosto 2023



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024