

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

JUNIO - AGOSTO

CULTIVO: FRIJOL



Para el período junio y agosto 2024, se prevé las siguientes condiciones térmicas diurnas: predominarían condiciones superiores a lo normal en sierra y selva, a excepción de la costa sur con condiciones inferiores a lo normal en junio. Condiciones térmicas nocturnas, sobre lo normal en sierra norte oriental y selva en julio y agosto. Y debajo de lo normal en costa sur entre junio a agosto. En junio, se prevé acumulados de precipitaciones dentro de sus normales en costa sur y sierra norte oriental, sobre lo normal en selva norte baja. En julio, las condiciones serían normales en costa sur y sierra norte occidental, superiores en sierra norte oriental e inferiores en selva y sierra sur oriental. En agosto, las condiciones serían normales en costa sur y sierra norte occidental, superiores en sierra norte oriental e inferiores en selva y sierra centro sur oriental

COSTA NORTE

En costa norte se prevé un nivel de riesgo agroclimático bajo durante el trimestre junio-agosto, porque las condiciones térmicas diurnas y nocturnas se encontrarían entorno a sus valores normales, lo que favorecería las siembras del cultivo de frijol a partir del mes de julio y el establecimiento en parcelas que se encontrarían en condiciones de humedad en los valles del bajo Piura.

COSTA SUR

En junio el cultivo de frijol continuaría su desarrollo vegetativo (tercera hoja trifoliada) y reproductivo (botón floral), por ello se estima un riesgo agroclimático medio debido a que, las temperaturas diurnas y nocturnas (normal inferior e inferior respectivamente) ralentizarían el crecimiento vegetativo. En julio y agosto, se prevé temperaturas mínimas debajo de sus normales que retrasarían las fases de llenado de vaina para las zonas productoras Ocoña y Camaná en Arequipa por ello el nivel de riesgo agroclimático se mantendría entre medio -alto.

SIERRA NORTE

Durante el periodo junio-agosto se prevé un riesgo agroclimático medio debido a que, temperaturas diurnas y nocturnas sobre lo normal favorecerían a los insectos plaga del cultivo de frijol. Por otro lado, las lluvias entorno a sus normales ayudarían a mantener la humedad en los suelos que beneficiarían la fase de llenado de vaina; sin embargo, cabe mencionar que el riesgo se incrementaría debido a que las lluvias serían insuficientes por ser la época de estiaje y siendo más pronunciada en el mes de agosto.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA.
SUSCRIBETE AQUI

SIERRA CENTRAL



Para el trimestre junio-julio-agosto, en sierra centro oriental, se prevé un riesgo agroclimático medio debido a que, las temperaturas diurnas y nocturnas superiores a sus normales proporcionarían la condiciones favorables para las plagas asociadas al cultivo de frijol, aunado a un régimen de precipitaciones inferior a sus normales para junio y normal inferior para agosto que impactaría en el llenado de vaina y crecimiento de granos de frijol en las zonas productoras de Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba (Junín).


SELVA NORTE

En junio, el cultivo se encontraría en pleno crecimiento vegetativo; sin embargo, se estima un riesgo agroclimático medio durante el trimestre junio-julio-agosto debido a que, las temperaturas diurnas y nocturnas superiores a sus normales podrían incrementar la población de plagas y propiciar las condiciones favorables para la proliferación de enfermedades asociadas al cultivo; sin embargo, las precipitaciones alrededor de sus normales favorecerían su desarrollo vegetativo, floración y llenado de la vaina que podrían acontecer en los próximos meses en las zonas productoras de frijol del Huallaga central en el departamento de San Martín.

SELVA CENTRO

En junio, el cultivo de frijol se encontraría en desarrollo vegetativo; sin embargo, se estima un riesgo agroclimático medio durante el trimestre junio-julio-agosto debido a que, las temperaturas diurnas y nocturnas superiores a sus normales podrían incrementar la población de plagas y propiciar las condiciones favorables para la proliferación de enfermedades asociadas al cultivo. En relación a las lluvias, se esperan valores normal e inferior en los meses del pronóstico, estas condiciones generarían afectación en el crecimiento del cultivo, siendo las fases de primera hoja trifoliada, tercera hoja trifoliada y botón floral (crecimiento reproductivo) las que se verían perjudicadas en las zonas productoras de la selva de Junín (Satipo y Chanchamayo).





TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Julio 2024



Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024