

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

SETIEMBRE - NOVIEMBRE

CULTIVO: FRIJOL



Entre setiembre y noviembre de 2025, en la costa se prevé precipitaciones entre normales inferiores a normales, mientras que las temperaturas diurnas y nocturnas se mantendrán entre valores normales inferiores a normales. En la sierra norte se prevé que las precipitaciones varíen entre inferiores a normales superiores, las temperaturas entre normales inferiores a superiores. En la selva norte y centro se prevé que las precipitaciones varíen entre normal inferiores a normales superiores, mientras que las temperaturas entre normal a superior.

COSTA SUR

En la costa sur, se anticipa temperaturas diurnas y nocturnas entorno a sus valores habituales durante setiembre, octubre y noviembre. En relación al cultivo de frijol, las condiciones térmicas típicas para el trimestre representan un riesgo agroclimático bajo y muy bajo, debido hasta setiembre se culminaría con el desarrollo fenológico del cultivo en la region y los campos se encontrarían en cosecha hacía finales del mes. Además, al ser condiciones térmicas en sus valores normales beneficiaran a que los granos de frijol lleguen con la humedad adecuada en las zonas productoras de Ocoña y Camaná. Cabe resaltar que para octubre y noviembre los terrenos de producción se encontrarían en periodo de descanso.

SIERRA NORTE

En sierra norte oriental, durante setiembre se estima temperaturas máximas superior a sus valores normales en setiembre, con posibilidad de estar en torno a sus valores habituales en octubre y noviembre. Las temperaturas mínimas, por su parte, oscilarían entre valores normal-superior y superior en setiembre y octubre respectivamente, presentando en noviembre valores normal-inferior. En cuanto a las precipitaciones, se esperan acumulados en torno a su promedio histórico durante el trimestre, lo cual garantizaría la disponibilidad de agua en los suelos para el crecimiento adecuado del cultivo de frijol bajo secano. Por esta razón, se prevé un riesgo agroclimático bajo durante el periodo pronosticado. Con la condicionante que setiembre aún registra normales bajas para el sustento del cultivo.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA.
SUSCRIBETE AQUÍ

En la sierra norte occidental, en setiembre las temperaturas diurnas se presentarían superior a sus valores normales y oscilarían entre normal y normal superior para octubre y noviembre. En cuanto a las temperaturas nocturnas, en setiembre serían en torno a sus normales, siendo superior en octubre y normal inferior en noviembre. Las lluvias previstas para este periodo estarían entre normal y normal inferior para setiembre y octubre respectivamente; sin embargo, se proyecta que en noviembre las precipitaciones se situarán por debajo de los promedios históricos, lo que podría incrementar el riesgo agroclimático a un nivel medio. Esta elevación del riesgo se atribuye a la alta dependencia del cultivo de frijol a la disponibilidad hídrica directa de las lluvias para sus etapas de desarrollo.



SELVA NORTE


En la selva norte alta, las temperaturas diurnas se mantendrían entorno a sus valores habituales en setiembre y noviembre; siendo superior a sus promedios históricos octubre. En relación a las temperaturas mínimas se prevén valores superiores a normales. En cuanto a las lluvias, se prevé valores que oscilarían entre normal y normal-superior. Para este contexto, se estima que el riesgo agroclimático se encontraría en niveles bajo-medio, debido a que las temperaturas nocturnas cálidas influirían en el incremento poblacional de plagas asociadas al cultivo, asimismo al aumentar la evapotranspiración del frijol (con ello su demanda hídrica) y afectando la tasa fotosintética lo cual podría impactar en el rendimiento final del cultivo.

SELVA CENTRO

Durante el trimestre conformado por setiembre, octubre y noviembre de 2025, se prevén temperaturas máximas entorno a sus valores habituales y siendo ligeramente superior en noviembre. En relación a las temperaturas mínimas estas oscilarían entre valores habituales en setiembre-octubre y superior a sus promedios históricos en noviembre. En cuanto a las precipitaciones, se espera un comportamiento normal (siendo ligeramente inferior en setiembre y noviembre). De acuerdo a lo mencionado, las condiciones térmicas favorecerán el desarrollo fenológico óptimo del cultivo de frijol, particularmente en las etapas de formación y llenado de vainas; sin embargo, en noviembre las fases de floración (de coincidir) pueden verse afectadas por las temperaturas nocturnas cálidas. Las precipitaciones pronosticadas, al mantenerse dentro de los rangos normales para la temporada prevista, garantizarán la continuidad de las plantaciones mediante una adecuada disponibilidad hídrica en el suelo. Esta condición, a su vez, determinará un riesgo agroclimático bajo durante todo el periodo del pronóstico, reforzando las expectativas de una campaña productiva favorable.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA.
SUSCRIBETE AQUI





TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Octubre 2025



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

