

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

ABRIL - JUNIO

CULTIVO: PALTO



Fuente: Nur Afni Setyaningrum

Se prevé las siguientes condiciones térmicas diurnas para el mes de abril, entre sus normales en la sierra; superiores en la costa; para el mes de mayo y junio, entre normales a superiores para la costa, sierra centro y sierra sur. Respecto a las condiciones térmicas nocturnas, en abril, entre sus normales a superiores en la costa y sierra. Para el mes de mayo, superiores en la costa norte, costa sur, sierra central y sur. Para el mes de junio, valores superiores costa, a excepción de sierra centro oriental, con valores por debajo de lo normal. Respecto a las precipitaciones, en la costa y la sierra, para el periodo de abril a junio predominan acumulados entre normales a superiores; a excepción de la sierra sur y centro oriental el mes de mayo; y de la sierra sur oriental en el mes de junio, debido a que sus acumulados estarían por debajo de lo normal.

COSTA NORTE

En los departamentos de Lambayeque y La Libertad, el nivel de riesgo agroclimático se presentaría en un nivel medio, debido a que la temperatura máxima prevista entre los meses de abril y junio por encima de lo normal afectaría las parcelas sembradas con palto Hass, las cuales se encuentran en fase de maduración; de igual modo las precipitaciones afectaría la calidad del fruto de exportación, y el anegamiento no permitiría realizar las labores de cultivo por la presencia del niño costero, lo que adicionalmente propiciaría la persistencia de plagas y enfermedades.

COSTA CENTRAL Y SUR

En la costa central, entre los meses de abril - junio, se estima un nivel de riesgo agroclimático de medio a bajo, debido a que se prevé un régimen térmico por encima de su normal, especialmente para el mes de abril, lo cual podría acelerar la maduración del palto. En el departamento de Ica, el nivel de riesgo sería bajo debido a que el cultivo se encuentra en fase de maduración. En la costa sur, el nivel de riesgo sería de medio a bajo, a causa de las condiciones térmicas que continuarían por encima de su normal, lo que puede favorecer la presencia de plagas estacionales como queresas (negra), arañita roja y mosca blanca, que puede afectar la calidad del fruto.



SIERRA CENTRAL

En los meses de abril – junio, se presentarían niveles de riesgo medio a alto; asimismo, las condiciones térmicas sobre su normal entre mayo a junio, podrían afectar la maduración del palto Fuerte. En los valles de la sierra centro, en las zonas de Llauta y San Juan de Castrovirreyna, el cultivo de palto se encuentra en fase de maduración y se estimaría un nivel de riesgo agroclimático de medio a bajo por las precipitaciones por debajo de lo normal en el mes de mayo, del mismo modo las temperaturas persistentes por encima de lo normal propiciarían la presencia de plagas.

SIERRA SUR

Se prevé niveles de riesgo agroclimático de medio a alto para los meses de mayo y junio, debido a que la precipitación estaría por debajo de lo normal y las temperaturas estarían por encima de lo normal, lo que podría afectar la maduración del palto Hass; sin embargo, no se presentarían problemas para el palto fuerte, ya que se encuentra en foliación. Asimismo, la incidencia de plagas de temporada podría afectar la calidad del fruto en los departamentos de Apurímac y Cusco.

Para las zonas de producción de Arequipa y Moquegua, el nivel de riesgo agroclimático sería medio, ya que el cultivo se encuentra en la etapa de maduración, especialmente por las temperaturas máximas previstas por encima de lo normal hasta el mes de junio. En algunas zonas, el cultivo de palto se encuentra en floración, lo que podría afectar el cuajado de los frutos. Cabe señalar que, el palto en esta zona se desarrolla en valles interandinos, por lo que se debe tener cuidado con los riegos y la incidencia de plagas principalmente la mosca blanca, arañita roja, entre otros.

**PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ**



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

NIVELES DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

Regiones	CORTO PLAZO					MEDIANO PLAZO									
	Abril 2023					Mayo 2023					Junio 2023				
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto	Muy alto
Costa Norte															
Costa Centro															
Costa Sur															
Sierra Centro															
Sierra Sur															

RIESGO*:

Es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.

RIESGO AGROCLIMÁTICO*:

Es la probabilidad de que ocurran pérdidas de producción (o de calidad) en una actividad agraria por efecto de fenómenos climáticos.

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO*:

Tiene como finalidad contribuir a la reducción de los impactos socio económicos derivados de la acción del clima sobre la actividad agrícola en un territorio de interés.

TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Mayo 2023

*CIIFEN, 2017



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



