

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

DICIEMBRE - FEBRERO

CULTIVO: PALTO



Fuente: Nur Afni Setyaningrum

De acuerdo a los escenarios para el trimestre diciembre 2024 – enero y febrero 2025, en la costa y sierra se esperan condiciones normales y superiores para la precipitación, a excepción de la costa norte, que presenta un escenario inferior. Respecto a las condiciones térmicas diurnas y nocturnas, se esperan condiciones entre normales y superiores.

COSTA NORTE

En los departamentos de Lambayeque y La Libertad, para el trimestre diciembre 2024 a febrero 2025, se prevé temperaturas máximas entre normales a superiores a lo normal, mientras que las temperaturas mínimas se mantendrían en torno a su variabilidad climática normal; asimismo, las precipitaciones serían inferiores a sus normales en todo el trimestre. Estas condiciones térmicas previstas propiciarían el avance de la fructificación del palto Hass; sin embargo la demanda hídrica incrementaría significativamente ya que las plantaciones requieran una mayor frecuencia y volumen de riego para garantizar un adecuado llenado de los frutos (calibre). Este panorama podría afectar especialmente a plantaciones dependientes de riego regulado por la deficiencia de precipitaciones que se vienen presentando en la sierra norte occidental. Por otro lado, las condiciones diurnas ligeramente cálidas podrían propiciar condiciones para la presencia de plagas como la mosca blanca, el ácaro marrón y las queresas; por lo que el nivel de riesgo agroclimático estimado sería medio durante el trimestre.

COSTA CENTRAL Y SUR

En la costa central y sur para el trimestre diciembre a febrero, se estima un nivel de riesgo agroclimático de bajo a medio, debido a la prevalencia de temperaturas diurnas y nocturnas ligeramente cálidas propias del inicio de la estación de verano, lo que favorecería el crecimiento y maduración de frutos; sin embargo, en zonas próximas al litoral de la costa central la prevalencia de alta humedad ambiental con presencia de lloviznas serían propicias para la incidencia de enfermedades fungosas como la antracnosis, entre otros que afectarían la calidad del fruto.


PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA.
SUSCRIBETE AQUI



SIERRA CENTRAL

Para la sierra central durante los meses de diciembre a febrero, se presentaría un nivel de riesgo agroclimático medio, debido a que se esperaría lluvias dentro de lo habitual, garantizando el suministro hídrico para las plantaciones que se encuentran en pleno llenado de frutos y propiciaría una maduración uniforme. Sin embargo, las condiciones de humedad y temperaturas diurnas calidas podrían ocasionar la incidencia de problemas fitosanitarios, lo que afectaría principalmente la calidad del fruto.

SIERRA SUR

Para las zonas de producción en la sierra de Arequipa y Moquegua, entre diciembre a febrero se estima un nivel de riesgo agroclimático de bajo a medio ya que se preve lluvias normales y condiciones térmicas normales a cálidas, promoviendo un nivel adecuado de humedad en el suelo y una maduración uniforme. Por otro lado, no se descartaría el incremento de la incidencia de plagas tales como las queresas, la arañita roja y la mosca blanca, que afectarían el normal desarrollo de las plantaciones.





PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Enero 2025



PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024