

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

MARZO - MAYO

CULTIVO: PALTO



Fuente: Nur Afni Setyaningrum

Durante marzo, abril y mayo 2026, respecto a la precipitación en la costa se esperan condiciones entre normales y superiores, en la sierra se esperan condiciones entre normales a superiores. Respecto las temperaturas máximas y mínimas en la costa se esperan condiciones superiores, en la sierra se esperan condiciones entre normales a superiores.

COSTA NORTE

En los departamentos de Lambayeque y La Libertad, el escenario de un evento El Niño Costero en desarrollo según último Comunicado Oficial ENFEN N°04-2026, contexto en el cual, se estima temperaturas máximas y mínimas superiores a lo normal de marzo a mayo de 2026. Asimismo, las lluvias serían superiores a lo normal con una mayor probabilidad de episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, sin descartarse eventos extremos durante marzo y abril, que, en consecuencia, configuraría un nivel alto para marzo y abril, reduciendo a nivel medio en mayo. Bajo este panorama, el exceso de lluvia podría producir anegamientos en las plantaciones; retrasando la acumulación de materia seca en los frutos, afectando las cosechas. Además, podría afectarse el acceso a los fundos en la realización de las labores agrícolas; adicionalmente, aumentaría las afectaciones fitosanitarias.

COSTA CENTRAL Y SUR

Para las plantaciones de palto ubicados en la costa central, Lima y sur en los departamentos de Ica, Arequipa y Moquegua, prevé condiciones térmicas entre normales a cálidos durante marzo hasta mayo y las precipitaciones serían normales. En este periodo el cultivo se desarrollará entre fructificación y maduración. Las elevadas temperaturas podrían provocar caída de frutos, así como aceleración de la maduración, con frutos de menor tamaño si no se maneja adecuadamente el riego y la humedad de suelo. En consecuencia, el nivel de riesgo agroclimático variaría entre bajo a medio. Debido a las condiciones climáticas podría incrementarse la incidencia de plagas y enfermedades.

SIERRA CENTRAL


El desarrollo del cultivo de palto en el departamento de Ayacucho (Huanta-Luricocha), que continuará en maduración y cosechas durante marzo, abril y mayo de 2026, continuaría su desarrollo en condiciones climáticas entre normales a cálidos y precipitaciones normales a superiores al promedio climático local. Lo cual, podría favorecer el crecimiento de frutos; sin embargo, las lluvias podrían dificultar las labores de cosecha y favorecer la presencia de enfermedades. En abril - mayo, la prevalencia de temperaturas cálidas, podría afectar el proceso de inducción floral para la siguiente campaña agrícola 2026-27. Con estas condiciones ambientales, el nivel de riesgo agroclimático variaría entre bajo a medio.

Las condiciones climáticas previstas para Huánuco y el cultivo de palto, durante el período marzo a mayo de 2026, periodo en el que las temperaturas y precipitaciones variarían entre normales a superiores, respecto de su climatología local. En esta zona el cultivo se encuentra en fructificación, estado fenológico que se vería favorecido. Sin embargo, en parcelas que no cuenten con sistema de drenaje operativo, podría condicionar a la acumulación de exceso de humedad en el suelo y la parcela, favoreciendo la proliferación de enfermedades. Para estas condiciones el nivel de riesgo se incrementaría a niveles entre bajo, medio e incluso alto en zonas localizadas. Se recomienda monitorear, la incidencia de plagas y enfermedades, para la aplicación oportuna del manejo integrado.

SIERRA SUR

Para las parcelas del cultivo de palto ubicados en los valles interandino de los departamentos de Arequipa, occidente de Ayacucho, y Moquegua, se esperan condiciones térmicas entre normales a cálidos y precipitaciones que superaría sus promedios habituales, durante los meses de marzo, abril y mayo. Estas condiciones climáticas promoverían el crecimiento de frutos. Sin embargo, las lluvias podrían dificultar las labores de cosecha; además, las condiciones cálidas incrementarían las necesidades hídricas del cultivo durante los días secos, del mismo modo, serían favorables para el desarrollo de poblaciones de plagas. Por otro lado, la prolongación del periodo cálido entre abril y mayo, podría comprometer el proceso de inducción floral para la campaña agrícola 2026-27. Con este escenario el nivel de riesgo variaría entre bajo, medio y alto. No se descarta ocurrencia de lluvias intensas que afecten los sistemas de regadío y el traslado de las cosechas a los mercados locales o centros de acopio.



[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,](#)
[SUSCRIBETE AQUÍ](#)



PERÚ

Ministerio
del Ambiente





Ministerio
del Ambiente



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Abril 2026



PERÚ

Ministerio
del Ambiente

