

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

NOVIEMBRE - ENERO

CULTIVO: QUINUA



Para el período noviembre 2023 – enero 2024, se prevé las siguientes condiciones térmicas diurnas: predominan temperaturas superiores a lo normal en la región andina, a excepción de la sierra centro occidental donde predominarían las condiciones dentro de su normal climática en diciembre. Por otro lado, se esperarían condiciones térmicas nocturnas superiores a su climatología en el en la región Andina; excepto por la sierra sur, que estarían dentro de lo normal en noviembre.

Respecto a las precipitaciones, para noviembre, se esperan que sierra centro y sur occidental predominen condiciones normales e inferiores a su normal en la sierra sur oriental. Mientras que, entre diciembre 2023 y enero 2024, la condiciones en sierra centro



SIERRA CENTRAL


En la sierra central, durante el trimestre noviembre-diciembre-enero, se prevé un riesgo agroclimático entre bajo a medio, debido a que se prevé precipitaciones entre normales a superiores que podrían favorecer el inicio de la campaña de siembras y las necesidades hídricas durante los primeros estadios del cultivo de quinoa. Considerando que las mayores áreas sembradas se dan entre la quincena de noviembre y la primera semana de diciembre, siendo las variedades Hualhuas y Huancayo las más difundidas en el Valle del Mantaro.

SIERRA SUR Y ALTIPLANO

En la sierra sur, durante el trimestre noviembre-diciembre-enero se presentaría un nivel de riesgo agroclimático de medio a alto, debido a que se prevé un régimen térmico sobre sus normales y precipitaciones por debajo de sus normales las cuales afectarían la disponibilidad hídrica durante la formación de las primeras hojas. Así mismo; las temperaturas más cálidas y lluvias irregulares al inicio de la campaña favorecerían el desarrollo de poblaciones de plagas. Además, no se descartaría la ocurrencia de heladas.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ





TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Diciembre 2023