

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

DICIEMBRE - FEBRERO

CULTIVO: QUINUA



De acuerdo a los escenarios para el trimestre diciembre 2024 – enero y febrero 2025, en la sierra centro y sur se espera condiciones normales y superiores para la precipitación, respecto a las condiciones térmicas diurnas se esperan condiciones normales, además, para las condiciones térmicas nocturnas se espera condiciones normales y superiores.

SIERRA CENTRAL



En la sierra central durante el mes de diciembre se estima un nivel de riesgo bajo, debido a que se esperan lluvias normales a su climatología principalmente en localidades de Vilcashuaman en Ayacucho, estas condiciones favorecerían el establecimiento y avance del cultivo. Sin embargo entre los meses de enero y febrero el nivel de riesgo incrementaría de medio a alto, debido al registro de lluvias excesivas que generarían posibles daños por exceso de humedad en el suelo, sin descartar la ocurrencia de eventos extremos de corta duración como las granizadas; asimismo, la alta humedad generaría ambientes propicios para la incidencia de enfermedades fitosanitarias, afectando etapas susceptibles del cultivo.

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ

SIERRA SUR Y ALTIPLANO

Durante el mes de diciembre se estima un nivel de riesgo agroclimático bajo debido a que se espera el registro de lluvias de normales a superiores, lo que favorecería el avance de primeras etapas vegetativas; asimismo, las condiciones térmicas diurnas y nocturnas, variarían entre ligeramente calidas y calidas, favoreciendo el desarrollo del cultivo. Para los meses de enero y febrero, se esperan lluvias superiores a su normal condicionando un nivel de riesgo medio principalmente en aquellas parcelas dispuestas en campos con pendiente favorable y que cuenten con buen drenaje sin embargo, en zonas bajas, el riesgo se incrementaría a un nivel alto, ya que los sembríos de quinoa estarían expuestas a excesos de humedad de suelo y posibles inundaciones, promoviendo condiciones favorables para el desarrollo de enfermedades radiculares y foliares principalmente el mildiu de la quinoa.

Durante este periodo de análisis, no se descarta ocurrencia de heladas y granizadas, de comportamiento localizado, que podrían afectar a la quinoa.




PERÚ

Ministerio
del Ambiente



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Enero 2025