

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

OCTUBRE - DICIEMBRE

CULTIVO: QUINUA

Durante octubre a diciembre de 2025, en la sierra centro y sur se prevé que las precipitaciones varíen entre valores inferiores a superiores, mientras que las temperaturas diurnas y nocturnas entre normales inferiores a superiores.

SIERRA CENTRAL



Las precipitaciones y temperaturas variarían entre normales a superiores, en la sierra central, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, exceptuando noviembre en la sierra central occidental, que podrían ser inferiores para ambas variables climáticas. Bajo estas condiciones climáticas, en Ayacucho el cultivo de quinua sería favorecido, tanto en las siembras anticipadas como en las nuevas siembras. Las lluvias podrían aportar humedad complementaria al suelo a las parcelas de quinua, favoreciendo, desde la emergencia y crecimiento vegetativo inicial. En ese sentido, es posible que el nivel de riesgo agroclimático varíe entre bajo y medio, dado que no se descarta la ocurrencia de granizadas y heladas de manera localizada, que podría incrementar el riesgo agroclimático.

El cultivo de quinua en el departamento de Junín, en las parcelas con sistema de riego progresivamente irían realizándose las siembras. Por otro lado, áreas de producción bajo sistema de secano, las lluvias favorecerían la preparación de terreno y siembras durante el trimestre. El riesgo agroclimático, variaría de bajo a medio.

SIERRA SUR Y ALTIPLANO

Para octubre, noviembre y diciembre de 2025, el desarrollo de la quinua se esperan condiciones climáticas, en cuanto a precipitaciones entre normales a superiores, por otro lado, las temperaturas nocturnas serían menos frías del habitual y entre normal a ligeramente cálido durante el día. Paralelamente, el cultivo de quinua entre octubre y primeros días de noviembre, se completarían las siembras; posterior a ello, junto a las siembras realizadas en septiembre, avanzarían su desarrollo fenológico entre emergencia, crecimiento vegetativo inicial (establecimiento), hasta ramificación. En este escenario climático pronosticado, la quinua se desarrollaría favorablemente, no obstante, no se descartan la ocurrencia de heladas, veranillos y granizadas, que condicionarían variaciones en el riego agroclimático entre nivel bajo a medio.


PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA.
SUSCRIBETE AQUÍ



PERÚ

Ministerio
del Ambiente





TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Noviembre 2025