

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

MARZO - MAYO

CULTIVO: QUINUA



Durante marzo, abril y mayo 2026, respecto a la precipitación en la sierra se esperan condiciones entre normales a superiores. Respecto a las temperaturas máximas y mínimas se esperan condiciones entre normales a superiores.

SIERRA CENTRAL

En la sierra central, durante el trimestre marzo–abril-mayo, se estima un nivel de riesgo agroclimático medio, debido a la probabilidad de registrarse temperaturas por encima de sus valores normales y precipitaciones entre normales a superiores a lo habitual. Estas condiciones de mayor humedad en el suelo podrían generar un ambiente favorable para el desarrollo y propagación de enfermedades fungosas, particularmente mildiu, lo que afectaría la etapa de crecimiento vegetativo y reproductivo en el valle del Mantaro, y el llenado de granos en sectores de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, comprometiendo el rendimiento y la calidad de la producción.

Asimismo, la persistencia de lluvias podrían dificultar la adecuada ventilación del cultivo, y el deterioro de las panojas. Por otro lado, hacia el mes de mayo, la ocurrencia de precipitaciones por encima de sus valores normales no sería favorable para el desarrollo oportuno de las labores de cosecha, ya que podría ocasionar retrasos en el ingreso a campo, incrementar el riesgo de pérdidas por acame, brotación del grano o deterioro de la calidad, así como limitar las condiciones adecuadas para el secado natural del grano.



SIERRA SUR Y ALTIPLANO


Para marzo, el riesgo para el cultivo se considera entre bajo y medio, debido a que las condiciones climáticas previstas, dentro de rangos normales a superiores, serían en general favorables para el desarrollo fenológico del cultivo. No obstante, las temperaturas máximas dentro de rangos normales a superiores podrían generar condiciones propicias para el incremento poblacional de la plaga kcona, así como para la presencia de problemas fitosanitarios.

En tanto para los meses de abril y mayo, las precipitaciones previstas dentro de rangos normales a superiores podrían generar excesos de humedad en el suelo, incrementando la susceptibilidad al acame (caída de plantas) y afectando el adecuado proceso de llenado y maduración fisiológica de los granos. Estas condiciones húmedas aunadas a días calidos continuarían favoreciendo el ataque de gusanos en panoja.

Finalmente estas condiciones, podrían dificultar las labores de cosecha y poscosecha, especialmente durante el trillado y secado del grano, afectando la calidad y el manejo de la producción, por lo que el nivel de riesgo podría incrementarse de medio a alto.

[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,](#)
[SUSCRIBETE AQUÍ](#)





TENER EN CUENTA:

El análisis del pronóstico de riesgo agroclimático es interpretado a partir de mapas provenientes de pronósticos climáticos. La incertidumbre de la predicción agroclimática aumenta en la medida en que sean más alejadas las fechas iniciales con respecto a la emisión del informe de predicción. Los boletines se actualizan mensualmente.

Próxima actualización: Abril 2026