Perú

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

Campaña agrícola 2023 - 2024
(febrero - abril)

En función al análisis del modelo WRF (Weather Research and Forecasting), para el trimestre febrero - abril 2024, prevé que las condiciones térmicas diurnas se presenten superiores a lo normal en todo el país a excepción de la costa sur. Respecto a las condiciones térmicas nocturnas, estarían por encima de lo normal en gran parte del país, no obstante, en la costa sur y sierra sur, el escenario más probable es dentro de sus rangos normales. Respecto a las precipitaciones, se esperarían para la sierra norte y selva norte condiciones de normales a superiores a su climatología. En el litoral costero se esperan lluvias dentro de su rango normal. Para la región andina se prevé lluvias inferiores de lo normal en la sierra sur.

ARROZ: Entre los meses de febrero y abril las condiciones climáticas previstas serían favorables para las etapas de floración y maduración del cultivo de arroz en la costa sur y selva norte. En la costa norte, se podría presentar una mayor incidencia de plagas durante las fases de crecimiento vegetativo en aquellas localidades que realizaron el trasplante entre los meses de noviembre y enero. ***CONOCE MÁS.***

CACAO: En la Selva norte de San Martin, se estima un nivel de riesgo bajo para febrero, debido a las precipitaciones con acumulados entre sus normales; en marzo, se incrementaría el nivel de riesgo agroclimático de bajo a medio, El nivel de riesgo se mantendría similar para abril. En la Selva centro de Pichanaki (Junín), se tendría un nivel de riesgo agroclimático medio para los meses de febrero a abril, debido a las temperaturas sobre lo normal, además de lluvias que podrían favorecer condiciones ambientales favorables para el desarrollo de enfermedades. En abril, las lluvias estarían con acumulados deficientes, generando estrés hídrico en las plantas. ***CONOCE MÁS.***

PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA, SUSCRIBETE AQUÍ

PERÚ Ministerio del Ambiente
Senamhi SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA DEL PERÚ
Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica
Tel.: 988 577 684; (511) 614-1413
Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe

Con Punche Perú
BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

CAFÉ: En la Selva norte, centro y sur prevalecería las condiciones térmicas diurnas y nocturnas cálidas y lluvias con acumulados entre y sobre sus normales. Hacia abril se esperarían lluvias por debajo de lo normal en la localidad de Alto Mayo (San Martin). En la Selva centro y sur, se espera que, de marzo a abril, condiciones que podría ocasionar déficit hídrico; En Quebrada Yanatile, se podría retrasar los periodos finales de la fase de fructificación. ***CONOCE MÁS.***

FRIJOL: En costa sur, el riesgo es nulo por presentar terrenos en descanso. En sierra norte las condiciones pronosticadas afectarían las primeras etapas de crecimiento del cultivo. En sierra central, se estima un riesgo medio debido a la influencia de temperaturas cálidas en el incremento de plagas que afectaría al cultivo en crecimiento. Asimismo, para selva central, para el mes de abril se estima un riesgo medio debido a las precipitaciones y la temperatura limitarían el crecimiento del cultivo frijol. ***CONOCE MÁS.***

MAÍZ: Para las regiones de la costa norte, central y sur continuaría favoreciendo un nivel de riesgo agroclimático entre bajo a medio. En la sierra norte, se presentaría un nivel de riesgo entre medio y alto, debido a la presencia de precipitaciones que favorecerían la presencia de enfermedades fitopatógenas. En la sierra central, se prevé un riesgo agroclimático entre bajo a medio, debido a que se prevé precipitaciones favorecerían las necesidades hídricas del maíz amiláceo. En la sierra sur, se presentaría un nivel de riesgo agroclimático medio, debido a que se prevé precipitaciones por debajo de sus normales, las cuales afectarían la disponibilidad hídrica. En la selva norte, se prevé un riesgo agroclimático bajo, debido a precipitaciones podrían favorecer la siembra y las necesidades hídricas del crecimiento vegetativo del maíz amarillo duro. ***CONOCE MÁS.***

PALTO: Se espera que el cultivo de palto se encuentre en la fase de maduración y labores de cosecha; asimismo, en costa central el pronosticos influiría en la tasa de crecimiento de los frutos y generaría una mayor tasa de evapotranspiración. Por otro lado, las precipitaciones, en la franja costera y la sierra, para el periodo de febrero a marzo predominan acumulados entre normales y bajo los normal; a excepción de la sierra sur que, en el mes de abril, registraría acumulados superiores a su normal donde será necesario considerar el control fitosanitario oportuno para prevenir problemas fitosanitarios. ***CONOCE MÁS.***

PAPA: Para la franja costera central y sur, las temperaturas previstas de marzo y abril favorecerán el inicio de las actividades de siembra de la campaña 2024. En la sierra norte y central, la campaña 2023/2024 se desarrollaría sin variaciones significativas; mientras que, en la sierra sur el descenso de las lluvias previstas podría afectar de manera significativa durante los meses de febrero y marzo. ***CONOCE MÁS.***

PASTOS: En marzo, el riesgo podría incrementarse en la sierra norte, debido a enfermedades que podrían afectar a las plantas. Contrariamente, se presentaría en las zonas altoandinas de la sierra sur y se prevé un nivel de riesgo medio, ya que las lluvias serían insuficientes para los pastos naturales. En abril, se anticipa precipitaciones por debajo de lo normal en la sierra norte y en la parte occidental de la sierra central lo que podría resultar una baja producción de materia seca. Por otro lado, en la sierra sur, se prevé lluvias superiores a los registros históricos, propicio para la recuperación de los pastos naturales, en algunos casos, serían desfavorables, si los pastizales llegarían a la etapa de senescencia en ciertas áreas altoandinas. ***CONOCE MÁS.***

QUINUA: En la sierra central, sur y Altiplano se estima un riesgo agroclimático entre bajo a medio, debido a las condiciones de humedad que podrían afectar las necesidades hídricas del cultivo de quinua en panoja y grano lechoso. ***CONOCE MÁS.***

Subdirección de Predicción Agrometeorológica
Tel.: 988 577 684; (511) 614-1413
Consultas y sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe