



Perú

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

Campaña agrícola 2024 - 2025
(noviembre - enero)

Los escenarios para el trimestre noviembre – diciembre 2024 y enero 2025, se estima que en la costa las condiciones térmicas diurnas se encuentran categorizadas entre normal-superior y superior, en la sierra se esperan condiciones entre normal y superior, en la selva se esperan condiciones superiores a su normal. Respecto a las condiciones térmicas nocturnas, se estima que en la costa se registren condiciones entre normal o normal-inferior, en la sierra se esperan condiciones entre normal, normal-inferior y superior, en la selva se esperan categorías superiores. Respecto a la precipitación, se estima que en la costa se registren condiciones entre normal, normal – inferior e inferior, en la sierra se esperan condiciones entre normal-inferior, inferior, normal superior y superior, en la selva se esperan condiciones entre normal inferior, normal inferior, normal superior y superior.

ARROZ: El déficit hídrico y la falta de agua en los reservorios de la costa norte aumentarían considerablemente el nivel de riesgo agroclimático en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad situándose entre alto y muy alto para los meses de noviembre y diciembre. [CONOCE MÁS.](#)

CACAO: Para la selva norte y centro, se prevé que los niveles de riesgo agroclimático fluctúen entre bajo y medio, debido a las lluvias con acumulados entre normales, asociados a las condiciones cálidas que podrían crear ambientes favorables para el incremento de plagas y enfermedades principalmente en parcelas en escaso manejo agronómico. Comprometiendo el normal desarrollo de la mazorca. [CONOCE MÁS.](#)

[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA.](#)
[SUSCRIBETE AQUÍ](#)

CAFÉ: Para la región Amazónica, los niveles de riesgo agroclimático fluctuarían entre bajo a medio. Debido a que habría ambientes favorables para el desarrollo de fructificación, principalmente en la selva norte de San Marín y Huánuco. Sin embargo, el nivel de riesgo incrementaría a medio debido al incremento de patógenos asociados a la humedad y las condiciones cálidas, principalmente en parcelas con deficiente manejo. [CONOCE MÁS.](#)

FRIJOL: En costa sur, no se prevé riesgo agroclimático durante el semestre debido a la finalización del cultivo de frijol. En sierra norte, se anticipan lluvias por debajo de lo normal en diciembre, lo que conlleva un riesgo agroclimático de nivel medio-alto. En selva norte y central, se espera que las lluvias se mantengan dentro de los valores habituales durante el periodo, lo que resulta en un riesgo agroclimático bajo. [CONOCE MÁS.](#)

MAÍZ: En la franja costera, se esperaría un avance de la campaña de maíz amarillo duro acorde a lo esperado, sin descartar afectaciones por la limitación de la disponibilidad hídrica en algunos valles de la costa norte. En la región andina, el inicio de la campaña de maíz amiláceo continuará con muchas limitaciones por escasez de humedad, especialmente en la sierra sur y algunos sectores de la sierra norte durante noviembre; sin embargo, se prevé que estas condiciones mejoren para diciembre y enero. En la región amazónica, las actividades de la campaña de maíz amarillo duro continuarían favorablemente [CONOCE MÁS.](#)

PALTO: Las condiciones térmicas previstas entre normales a ligeramente cálidas, contribuirá al avance de la campaña en curso, especialmente para las plantaciones que se encuentran en plena fructificación, estimándose un riego bajo. Sin embargo, debido a las condiciones propias de primavera y verano, se prevén una disminución significativa de nuevas floraciones. Por otro lado, también debido a dichas condiciones es más probable un incremento de problemas fitosanitarios y una mayor demanda de riego; por lo que los riesgos estimados podrían incrementar hasta un nivel medio. [CONOCE MÁS.](#)

PAPA: Durante el mes de noviembre, las actividades de labranza y siembra en secano continuarían limitadas, debido a las lluvias previstas de normales a inferiores con respecto a su promedio climático y por la prevalencia de días cálidos, especialmente en la sierra central y sur. Sin embargo, estas condiciones agrometeorológicas se normalizarían durante diciembre y enero, propiciando el avance de la campaña 2024-2025. [CONOCE MÁS.](#)

PASTOS: En noviembre de 2024, se anticipan precipitaciones normales a inferiores y temperaturas diurnas superiores a lo habitual en la sierra norte, lo que podría favorecer la prevalencia de plagas en cultivos como la alfalfa, generando un riesgo medio. En diciembre de 2024, se prevén precipitaciones por debajo de lo normal en la vertiente occidental, con temperaturas diurnas y nocturnas más altas, lo que incrementaría el riesgo agroclimático, especialmente en pasturas. Para enero de 2025, se espera un nivel de riesgo similar, con precipitaciones normales en la vertiente occidental y superiores en la oriental, lo que podría beneficiar la recuperación de las plantas, aunque se debe considerar la posibilidad de heladas en áreas altoandinas de la sierra centro. [CONOCE MÁS.](#)

QUINUA: En la sierra central durante el mes de noviembre se estima un nivel de riesgo medio a alto, por el contrario, en los meses de diciembre y enero se prevé un nivel de riesgo bajo a medio, con lluvias entre normales a superiores que promoverían el desarrollo vegetativo. Para el altiplano se estima un nivel de riesgo medio a alto durante el mes de noviembre, debido a la insuficiente humedad, aunado a condiciones cálidas, lo que retrasaría las siembras y desarrollo de primeras hojas, entre diciembre y enero, se esperan lluvias entre sus valores normales lo que ayudaría al crecimiento del cultivo de quinua. Por otro lado, no se descarta ambientes propicios para plagas. [CONOCE MÁS.](#)

