



Perú

PRONÓSTICO DE RIESGO AGROCLIMÁTICO

Campaña agrícola 2025 - 2026
(octubre - diciembre)

Entre octubre y diciembre del 2025, el litoral peruano experimentaría precipitaciones por debajo de lo normal, mientras que la sierra y la selva experimentarán precipitaciones entre por debajo de lo normal y por encima de lo normal. Las temperaturas máximas y mínimas en la costa serán por debajo de lo normal, en la sierra, temperaturas máximas entre normales y por encima de lo normal y temperaturas mínimas entre normales inferiores a normales; y en la selva, las temperaturas estarían por encima de lo normal.

ARÁNDANO: En Costa norte, el riesgo agroclimático podría incrementarse a nivel medio en diciembre, por temperaturas superior a 28° C de acuerdo a su estacionalidad. [CONOCE MÁS.](#)

ARROZ: En la costa sur las condiciones previstas permitirían la instalación de almácigos y el trasplante entre los meses de octubre y noviembre debido al incremento del caudal de los ríos que permitiría atender la demanda del recurso hídrico para el inicio de la campaña arrocera en el departamento de Arequipa. [CONOCE MÁS.](#)

CACAO: En la selva norte y centro se esperan condiciones favorables para el desarrollo de fructificación y maduración. No obstante, el incremento de temperaturas y la ausencia de lluvias en periodos cortos podrían generar ambientes favorables para el incremento de plagas y enfermedades, además de una mayor demanda de recurso hídrico. [CONOCE MÁS.](#)

[PARA MÁS INFORMACIÓN AGROCLIMÁTICA,
SUSCRIBETE AQUÍ](#)

CAFÉ: Durante el trimestre octubre-diciembre, en las principales zonas cafetaleras de Jaén, San Ignacio y San Martín, selva centro (Huánuco) y selva sur (Yanatile y Tambopata), se prevén condiciones climáticas mayormente dentro de su estacionalidad en cuanto a lluvias, con temperaturas que tienden a estar por encima de sus promedios históricos. Estas condiciones favorecerían el desarrollo de fases fenológicas del café como floración, cuajado y llenado de frutos. Sin embargo, el incremento de temperaturas y humedad podría generar riesgos asociados a una mayor demanda hídrica, daños en frutos y aumento de enfermedades fungosas como la roya amarilla, especialmente en noviembre y diciembre. [CONOCE MÁS.](#)

FRIJOL: En sierra norte occidental, el riesgo en noviembre sería medio, por lluvias inferior a sus valores habituales. En selva norte alta se estima riesgo agroclimático medio en diciembre por condiciones térmicas diurnas y nocturnas cálidas. En Selva central se prevé lluvias normales por lo cual se considera un riesgo agroclimático bajo. [CONOCE MÁS.](#)

MAÍZ: En la franja costera peruana, se espera que la campaña agrícola del Maíz Amarillo Duro (MAD) se desarrolle acorde a lo esperado, favorecido por las temperaturas de la estación y la disponibilidad hídrica; en tanto que, en la sierra sur y la sierra central, se espera que las primeras etapas de la campaña 2025-2026 se desarrolle sin muchos contratiempos. Sin embargo, en la sierra norte y las localidades de la vertiente occidental de la sierra central, es probable que una disminución de lluvias previstas y la presencia de días cálidos afecten las plantaciones instaladas y las actividades agrícolas durante el mes de noviembre. [CONOCE MÁS.](#)

PALTO: Entre los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, se espera que las condiciones térmicas en la costa sean normales y en la sierra - valles interandinos, varíen desde normales a cálidos. Bajo esas condiciones agroclimáticas, en la costa el nivel de riesgo variaría entre muy bajo y bajo, por otro lado, en los valles interandinos oscilaría entre niveles Bajo a medio. [CONOCE MÁS.](#)

PAPA: En la franja costera central y sur, la campaña chica 2025 finalizaría acorde a su temporada; en tanto que, en la sierra sur y la vertiente oriental de la sierra central, se esperaría que actividades de labranza y siembra, así como el brotamiento y emergencia de plántulas tenga lugar en su temporada correspondiente, favorecida por las lluvias previstas. Por el contrario, en los sectores de la sierra norte y la vertiente occidental de la sierra central, no se descartaría que un descenso de humedad y la presencia de temperaturas del aire cálidas afecten significativamente la ejecución de las actividades agrícolas y el desarrollo de las plantaciones instaladas durante el mes de noviembre. [CONOCE MÁS.](#)

PASTOS: Durante octubre, la sierra norte y centro presentarían condiciones favorables para el crecimiento de pastos debido a lluvias normales a superiores a lo habitual, aunque en noviembre y diciembre se prevé una disminución de las precipitaciones y aumento de temperaturas, lo que afectaría la disponibilidad de humedad y la producción de forraje, elevando el riesgo de medio a alto. La sierra sur, en la zona media, prevalecería un riesgo bajo en el trimestre con precipitaciones normales y temperaturas moderadas, pero en diciembre, las lluvias superiores a lo habitual favorecerían el crecimiento, aunque habría el riesgo de plagas y enfermedades. En las zonas de mayor altitud, las condiciones ambientales serían favorables para la brotación de pastos con un riesgo bajo; además, durante el último trimestre se observaría un crecimiento más notable de los pastos verdes. [CONOCE MÁS.](#)

QUINUA: El progreso de la campaña agrícola de la quinua, en la sierra central, sur y el Altiplano, en la fase inicial, dispondrían de lluvias entre normales a superiores, con temperaturas normales a ligeramente cálidas. Reduciendo el nivel de riesgo entre bajo a medio, durante octubre - diciembre. [CONOCE MÁS.](#)

