


PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE FRIJOL



Pronóstico Agrometeorológico

Del 23 de febrero al 05 de marzo de 2026

Según el [Aviso N°062](#), se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva central, por lo que no se descartan posibles afectaciones en los cultivos de frijol ubicados en zonas cercanas a los ríos, ante un eventual aumento del caudal. En parcelas no cercanas a los ríos, estas condiciones pueden favorecer la aparición y propagación de enfermedades causadas por hongos y bacterias, lo que hace indispensable un monitoreo constante para su detección oportuna. Asimismo, se recomienda mejorar el drenaje de las parcelas para evitar encharcamientos que promuevan la pudrición radicular y el desarrollo de patógenos. De manera complementaria, es importante mantener los campos limpios, eliminando malezas y residuos vegetales que puedan actuar como reservorios de plagas y enfermedades.



Próxima Actualización: 04 de marzo de 2026


Tener en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

2º Década de febrero del 2026 (11 al 20 de febrero)

El reporte fenológico mostró que los terrenos de la costa sur continuaron en estado de descanso a lo largo de la segunda decadiaria de febrero.



Tener en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de frijol observada al 20 de febrero del 2026; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.


Impactos del clima en el cultivo de frijol



En la **selva norte alta**, las temperaturas diurnas registraron un promedio de 27°C, mientras que, por la noche fueron de 18.7°C. Además, las condiciones térmicas diurnas y nocturnas fueron entorno a sus valores habituales. Respecto a las lluvias, en los últimos diez días se acumularon 87.9 mm, valor por encima de su promedio histórico. Asimismo, el Índice de Humedad se presentó como **"Exceso ligero"**. Las lluvias continuas pudieron provocar encharcamientos en zonas con deficiente drenaje, generando condiciones favorables para la aparición y propagación de enfermedades en el cultivo de frijol. En áreas de cultivos cercanas a los cauces y riberas de los ríos, se pudieron intensificar las afectaciones ya que las inundaciones temporales con arrastre de suelo fértil, anegamiento dañan el cultivo generando pérdidas parciales o totales.

En la **selva central**, la temperatura de día promedió 26.8°C y la de noche alcanzó 18.2 °C durante los últimos diez días. En relación a las condiciones térmicas diurnas y nocturnas entorno a sus valores habituales. Las lluvias fueron debajo de su normal registrando una acumulación de 97.5 mm y el índice de humedad fue catalogado como **"Exceso extremo"**. Las condiciones de lluvia y temperatura de la selva central favorecen el desarrollo del

cultivo de frijol; sin embargo, en comparación con la decadiaria anterior, se ha registrado un aumento de las lluvias. Este incremento pudo generar mayor humedad, en áreas de cultivo densas pudiendo favorecer la aparición de enfermedades causadas por hongos y bacterias. Por ello, se recomienda realizar un monitoreo continuo de las parcelas de manera oportuna.



Dirección de Agrometeorología
Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf.: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413
Consultas Sugerencias: serviciosagroclimaticos@senamhi.gob.pe



PERÚ Ministerio del Ambiente



¡EL PERÚ A TODA MÁQUINA!