

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE FRIJOL




Pronóstico Agrometeorológico

Del 04 al 13 de marzo de 2026

Según el [Aviso N°074](#), se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva norte y central. Ante la ocurrencia de lluvias, no se descartan posibles afectaciones en los cultivos de frijol que se vienen desarrollando en zonas cercanas a los ríos, debido a un eventual incremento del caudal y riesgo de inundación. En parcelas alejadas de los ríos, el exceso de humedad en el suelo podría favorecer la aparición y propagación de enfermedades causadas por hongos y bacterias.

En este contexto, se recomienda intensificar el monitoreo fitosanitario para una detección oportuna de síntomas, así como optimizar el drenaje de las parcelas a fin de evitar encharcamientos que puedan provocar pudrición radicular y facilitar el desarrollo de patógenos. De manera complementaria, es importante mantener los campos limpios, eliminando malezas y residuos vegetales que puedan actuar como reservorios de plagas y enfermedades.



Próxima Actualización: 13 de marzo de 2026

Tener en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

3º Década de febrero del 2026 (21 al 28 de febrero)

El reporte fenológico mostró que los terrenos de la costa sur continuaron en estado de descanso a lo largo de la tercera decadiaria de febrero.



Tener en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de frijol observada al 28 de febrero del 2026; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima en el cultivo de frijol



En la **selva norte alta**, las temperaturas diurnas registraron un promedio de 28.2°C, mientras que, por la noche fueron de 18.9°C. Además, las condiciones térmicas diurnas fueron entorno a sus valores habituales y nocturnas ligeramente cálidas. Respecto a las lluvias, en los últimos diez días se acumularon 55.1 mm, valor entorno a su promedio histórico. Las lluvias registradas fueron menores en comparación con la decadiaria anterior; sin embargo, aún se mantienen en un **"Exceso ligero"**. Estas condiciones de humedad pudieron favorecer la aparición y propagación de enfermedades en el cultivo de frijol, especialmente aquellas asociadas a hongos y bacterias.

En la **selva central**, la temperatura de día promedió 28.3°C y la de noche alcanzó 19.1 °C durante los últimos diez días. Las condiciones térmicas diurnas fueron entorno a sus valores habituales y nocturnas ligeramente cálidas. Las lluvias fueron encima de su normal registrando una acumulación de 68 mm, y el índice de humedad fue catalogado como **"Exceso ligero"**. En comparación con la decadiaria anterior, se ha registrado una disminución en las lluvias; pese a ello, aún persiste un ligero exceso de humedad en el suelo. Esta situación podría propiciar la aparición y diseminación de enfermedades causadas por hongos y bacterias en algunas áreas de cultivo. En este contexto, se recomienda mantener un monitoreo permanente y oportuno de las parcelas para prevenir posibles afectaciones en el cultivo.

