

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE FRIJOL




Pronóstico Agrometeorológico

Del 12 al 21 de marzo de 2026

De acuerdo con el [Aviso N.º 084](#), entre el viernes 13 y el sábado 14 de marzo se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva, con acumulados de hasta 70 mm/día en la selva norte y 80 mm/día en la selva centro. Estas condiciones podrían afectar los cultivos de frijol instalados en zonas cercanas a los ríos, ante un eventual incremento del caudal y riesgo de inundación. En parcelas más alejadas, el exceso de humedad en el suelo podría propiciar la aparición y propagación de enfermedades fúngicas y bacterianas.

Frente a este escenario, se recomienda reforzar el monitoreo fitosanitario para la detección temprana de síntomas, optimizar el drenaje de las parcelas a fin de evitar encharcamientos que favorezcan la pudrición radicular, y mantener los campos libres de malezas en la medida delo posible y residuos vegetales que actúen como reservorios de plagas y patógenos.



Próxima Actualización: 25 de marzo de 2026

Tener en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

1º Década de marzo del 2026 (01 al 10 de marzo 2026)

El reporte fenológico mostró que los terrenos de la costa sur continuaron en estado de descanso a lo largo de la primera decadiaria de marzo.



Tener en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de frijol observada al 10 de marzo del 2026; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima en el cultivo de frijol



En la selva norte alta, se registraron temperaturas diurnas promedio de 28.2 °C (ligeramente cálidas) y nocturnas de 19 °C (dentro de lo habitual). Durante los últimos diez días, las lluvias acumularon 58.7 mm, superando el promedio histórico, lo que incrementó el Índice de Humedad a un nivel de "Exceso ligero" respecto a la década anterior. Estas condiciones de humedad pudieron favorecer la aparición y propagación de enfermedades fúngicas y bacterianas en el cultivo de frijol, así como episodios de asfixia radicular en áreas cercanas a las riberas de los ríos.

En la selva central, durante los últimos diez días, se registró una temperatura diurna promedio de 28 °C (dentro de lo habitual) y nocturna de 19.1 °C (ligeramente cálida). Las lluvias alcanzaron un acumulado de 60.4 mm, superando su valor normal, mientras que el índice de humedad se mantuvo en nivel "Adecuado", aunque con una disminución respecto a la década anterior. Pese a esta reducción, persiste el riesgo de aparición y diseminación de enfermedades fúngicas y bacterianas en algunas áreas de cultivo. Por tanto, se recomienda mantener un monitoreo permanente y oportuno de las parcelas para prevenir posibles afectaciones.

