


PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE FRIJOL



Pronóstico Agrometeorológico

Del 24 de marzo al 02 de abril de 2026

De acuerdo con el [Aviso No 103](#), aún vigente, se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad en la selva, con acumulados cercanos a los 45 mm/día en la selva norte y valores próximos a los 50 mm/día en la selva centro. Estas condiciones podrían afectar los cultivos de frijol instalados en zonas cercanas a los ríos, ante un eventual incremento del caudal. En parcelas más alejadas, el exceso de humedad en el suelo podría favorecer la aparición de enfermedades fúngicas y bacterianas. Por ello, es recomendable reforzar el monitoreo fitosanitario para la detección temprana de síntomas, optimizar el drenaje de las parcelas a fin de evitar encharcamientos que propicien la pudrición radicular y mantener los campos libres de malezas (de ser factible) que puedan actuar como reservorios de plagas y patógenos.



Próxima Actualización: 07 de abril de 2026

Tener en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

2º Década de marzo del 2026 (11 al 20 de marzo)

El reporte fenológico mostró que los terrenos de la costa sur continuaron en estado de descanso a lo largo de la segunda decadiaria de marzo.



Tener en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de frijol observada al 20 de marzo del 2026; asimismo, muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Impactos del clima en el cultivo de frijol



En la selva norte alta, se registraron temperaturas diurnas promedio de 28.2 °C (dentro de lo habitual) y nocturnas de 19.1 °C (ligeramente cálidas). Durante los últimos diez días, las lluvias acumularon 56.2 mm, entorno a sus valores normales, mientras que el Índice de Humedad permaneció en el nivel de "Exceso ligero". En algunos sectores persistieron los riesgos por lluvias intensas, asimismo, el ambiente cálido y húmedo predominante pudo propiciar la aparición y propagación de enfermedades fúngicas y bacterianas en el cultivo de frijol, sumado a la ocurrencia de asfixia radicular en parcelas cercanas a las riberas de los ríos.

En la selva central, durante los últimos diez días, se registró una temperatura diurna promedio de 27.4 °C, dentro de lo habitual, y una nocturna de 18.7 °C, considerada ligeramente cálida. Las lluvias acumularon 105.1 mm, superando su valor normal, mientras que el índice de humedad alcanzó la categoría de "Exceso Extremo". Este escenario de alta humedad incrementa el riesgo de aparición y diseminación de enfermedades fúngicas y bacterianas en el cultivo de frijol, por lo que se recomienda mantener un monitoreo permanente y oportuno de las parcelas a fin de prevenir posibles afectaciones.

