

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO



Pronóstico Agrometeorológico


Del 22 de noviembre al 01 de diciembre de 2025

En la sierra central y sierra sur oriental

Para el desarrollo del cultivo de quinua en esta zona productora, se prevé acumulados entre 50 a 100 mm/10 días de manera muy puntual, aunado a condiciones térmicas entre normales a ligeramente cálidas. Este ambiente y condiciones de humedad favorecerían la preparación de terrenos y permitiría el avance de desarrollo en aquellos campos conducidos bajo riego; sin embargo, en parcelas bajo secano estas condiciones previstas retrasarían la emergencia y desarrollo de primeros estadios. No obstante, no se descarta la ocurrencia de heladas y granizadas de forma localizada.

En el Altiplano

En esta zona productora de quinua, según el pronóstico se espera días calidos con brillo solar y el registro de lluvias escasas de manera localizada. Estas condiciones podrían retrasar la emergencia uniforme y reducir el crecimiento de las plantas que se encuentren en primeros estadios fenológicos. Asimismo, perjudicaría la realización de labores culturales como deshierbo y abonamiento. No se descarta la ocurrencia de heladas y granizadas en este periodo. Se recomienda, estar atentos a los avisos de precipitaciones del SENAMHI, para realizar las actividades de las siembras de manera oportuna y mejor aprovechamiento de la humedad del suelo.





Próxima Actualización 03 de diciembre de 2025

Tomar en cuenta

- Pronóstico agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Impactos del clima en el cultivo de quinua

Durante el segundo decadiario de noviembre se registraron ligeras lluvias escasas, lo que ha generado un índice de humedad con deficiencia ligera en la sierra central. En contraste, la sierra suroriental y el Altiplano presentaron condiciones de deficiencia extrema de humedad, situación que limita el desarrollo de las primeras etapas vegetativas e incrementa el requerimiento hídrico del cultivo. Ante este panorama las estaciones de monitoreo agrometeorológico registraron estado del cultivo como bueno y regular.



Anexo: Estaciones de monitoreo fenológico de quinua a nivel nacional

Ubicación						Monitoreo Fenológico			
Estación	Departamento	Latitud	Longitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Fecha de siembra	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
CO-Acostambo	Huancavelica	-12.36611	-75.05639	3675	Quinua		Terreno en descanso		
CO-Colcabamba	Huancavelica	-12.41472	-74.66681	3055	Quinua		Terreno en descanso		
CO-Santa Ana	Junín	-12.00417	-75.22083	3295	Quinua		Terreno en descanso		
CO-Vilcashuaman	Ayacucho	-13.64833	-73.93444	3211	Quinua		Terreno en descanso		
CO-Cabanillas	Puno	-15.16958	-69.96989	3290	Quinua	03/11/2025	Siembra		
CO-Capachica	Puno	-15.60636	-69.83214	3828	Quinua	10/10/2025	Ramificación	27/11/2025	Bueno
CO-Ilave	Puno	-16.0675	-69.66194	3871	Quinua	11/10/2025	Emergencia	22/10/2025	Bueno
CO-Juli	Puno	-16.20378	-69.45992	3812	Quinua	16/10/2025	Siembra		
CO-Rincón de la Cruz	Puno	-15.990584	-69.810835	3887	Quinua	18/10/2025	6 hojas verdaderas	16/11/2025	Regular

Dirección de Agrometeorología

Subdirección de Predicción Agrometeorológica Telf.: [511] 614-1414 anexo 452 / 614-1413 Consultas y Sugerencias: dga@senamhi.gob.pe



PERÚ

Ministerio del
Ambiente

