

PRONÓSTICO AGROMETEOROLÓGICO CULTIVO DE VID




Pronóstico Agrometeorológico

Del 13 al 22 de febrero de 2026

Según el Aviso Meteorológico N° 048, el domingo 15 de febrero, se presentarán lluvias, de ligera a moderada intensidad, en la costa norte. Asimismo, se prevé incremento de la cobertura nubosa y sensación cálida en horas de la tarde, además de ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 25 km/h. Las condiciones previstas aumentarán la evapotranspiración y los requerimientos de riego en el cultivo de vid, del mismo modo, podrían provocar la caída espontánea de frutos durante la fase de maduración.

Según el pronóstico decadal de precipitaciones, en algunas localidades de la costa central como Tacama (Ica) y Calientes y Calana (Tacna) se registrarían lluvias entre 25 y 50 mm/dec, en tanto que, en localidades como Pacarán (Lima), se registrarían lluvias entre 75 y 100 mm/dec; mientras que en localidades de la selva norte como San Antonio (San Martín) se registrarían lluvias entre 100 y 150 mm/dec. El exceso de lluvias provocaría mayor acumulación de humedad en el suelo y afectaciones al buen estado fitosanitario de los viñedos.



Próxima Actualización 25 de febrero de 2026

Tomar en cuenta

- Pronóstico Agrometeorológico: herramienta de previsión que indica el posible comportamiento de los cultivos ante determinadas condiciones atmosféricas previstas, el cual apoya el planeamiento y manejo de las actividades agropecuarias.
- Monitoreo Agrometeorológico: es el seguimiento continuo de la influencia del tiempo y clima en las actividades agropecuarias y forestales.

Etapas de crecimiento

1º DÉCADA DE ENERO DE 2026 (Del 01 al 10)

El cultivo de vid presentó un desarrollo favorable en sus diversas etapas fenológicas, durante la primera década de febrero.

En la costa central, en la localidad de Pacarán (Lima) continuó la etapa de foliación o reposo vegetativo, en tanto que, en la localidad de Tacama (Ica) continuó la etapa de fructificación de la variedad Petit Verdot.

En la costa sur, en localidades como Quinistaquillas (Moquegua) y Calientes (Tacna) continuó la etapa de fructificación en variedades para pisco como la variedad Negra corriente; mientras que en la localidad de Calana (Tacna) continuó la etapa de maduración de la variedad Barbera.

En todas las localidades, el estado del cultivo fue bueno según los reportes de los observadores fenológicos.



Tomar en cuenta

- La información presentada en el mapa proviene de la red de observación fenológica del SENAMHI.
- El mapa contiene información de la última fase del cultivo de vid observada al 10 de febrero de 2026; asimismo muestra la evaluación visual del estado del cultivo reportada por el observador a la fecha.

Subdirección de Predicción Agrometeorológica

Dirección de Agrometeorología
Telf: [511] 614-1413

Consultas y Sugerencias
serviciosagrodinamicos@senamhi.gob.pe

Impactos del clima




En la costa central, se presentaron temperaturas máximas y mínimas de 29,7°C y 19,6°C; respectivamente. La ligera disminución de la temperatura retrasó la etapa de maduración en algunas localidades de la costa central en las variedades para pisco como Quebranta que se cultiva en la localidad de Pacarán (Lima).

En la costa sur, las temperaturas promedio fueron 30,6°C y 19,9°C para la máxima y la mínima, respectivamente. La temperatura cálida fue favorable para el crecimiento y la acumulación de azúcares en los frutos, asimismo, para conservar el buen estado fitosanitario del viñedo.

En la selva norte, se presentaron valores de temperatura máxima y mínima de 32,9°C y 22,2°C, respectivamente. La temperatura cálida registrada en algunas localidades de la selva norte baja como San Antonio (San Martín) fue favorable para el desarrollo de la vid regional que es cultivada en la región.

En la localidad de Tacama (Ica), se registraron valores de 36°C y 16,2°C para la temperatura máxima y mínima, respectivamente. El aumento de la temperatura, en la costa sur, también incrementó las necesidades de riego en el cultivo de vid, así como, acortó la etapa de maduración y cosecha en las variedades de vid de mesa y favoreció la acumulación de azúcares en las variedades para pisco.



Anexo: Estaciones de monitoreo

Departamento	Estación	Ubicación			Monitoreo Fenológico					
		Longitud	Latitud	Altitud (msnm)	Cultivo	Variedad	Fecha de hinchazón de yemas	Fase fenológica	Fecha inicio de fase	Estado
LIMA	CO Pacarán	-76.057930	-12.866890	684	VID	Quebranta	01/09/2025	Foliación	24/12/2025	BUENO
ICA	CO Tacama	-75.720520	-13.999780	429	VID	Petit Verdot	07/10/2024	Fructificación	06/11/2025	BUENO
MOQUEGUA	CO Quinistaquillas	-70.878580	-16.749710	1787	VID	Negra corriente	12/09/2025	Fructificación	02/01/2026	BUENO
TACNA	CP Calana	-70.1932	-17.974580	785	VID	Barbera	04/09/2025	Maduración	21/01/2026	BUENO
TACNA	CP Calientes	-70.13889	-17.87889	1200	VID	Negra corriente	01/09/2025	Fructificación	05/12/2025	BUENO